

販売名：アシノンZ胃腸内服液  
H<sub>2</sub>ブロッカー-胃腸薬 一般用  
30mL×3

ここを押してあける

ご使用に際して、この文書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

- ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・2週間を超えて続けて服用しないこと。重篤な消化器疾患を見逃すおそれがありますので、医師の診療を受けること。

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) ニザチジン等のH<sub>2</sub>ブロッカー薬によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、のどまぶた・口唇等のはれ)を起こしたことがある人。
- (2) 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。  
血液の病気、腎臓・肝臓の病気、胃・十二指腸の病気、ぜんそく・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アソール系抗真菌剤(白血球減少、血小板減少等を起こすことがある。)(腎臓・肝臓の病気を持っている場合には、薬の排泄が遅れて作用が強くなる可能性がある。)(胃・十二指腸の病気の治療を受けている人は、ニザチジンや類似の薬が処方されている可能性が高いので、重複服用に気をつける必要がある。)
- (3) 医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。(本剤を服用するとさらに血球数等が減少する可能性がある。)
- (4) 小児(15才未満)及び高齢者(80才以上)。
- (5) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳中。

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の胃腸薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 高齢者(65才以上)。(一般に高齢者は、生理機能が低下していることがある。)
- (4) 次の症状のある人。  
のどの痛み、咳及び高熱(これらの症状のある人は、重篤な感染症の疑いがあり、血球数減少等の血液異常が認められることがある。服用前にこのような症状があると、本剤の服用によって症状が増悪し、また本剤の副作用に気づくのが遅れることがある。)  
原因不明の体重減少、持続性の腹痛(他の病気が原因であることがある。)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、のどまぶた・口唇等のはれ
精神神経系	頭痛、眠気、めまい、手足・口のしびれ、混乱感

まれに本剤や他の同じ作用の薬の服用により、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすけ、くしゃみ、のどかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮剥離症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急速に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血液障害	のどの痛み、発熱、全身のだるさ、顔やまぶたの裏が白っぽくなる、出血しやすくなる(歯茎の出血、鼻血等)、青あざができる(押しても色が消えない等)があらわれる。

3. 誤って定められた用量を超えて服用してしまった場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

4. 服用後、次の症状があらわれることがあり、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること 便秘、下痢、口のかわき、はきけ

【効能・効果】胸やけ、むかつき、胃痛、もたれ  
(本剤は、胃のヒスタミンH<sub>2</sub>受容体に拮抗する薬を含んでいる。)  
＜効能・効果に関連する注意＞ 効能・効果に記載以外の症状では、本剤を服用しないこと。

【用法・用量】胸やけ、むかつき、胃痛、もたれの症状があらわれた時、下記の1回の量を服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上80才未満)	1瓶(30mL)	2回まで
小児(15才未満)		服用しないこと。
高齢者(80才以上)		服用しないこと。

・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1瓶(30mL)服用する。  
・症状が治まった場合は、服用を止めること。  
・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談すること。  
・2週間を超えて続けて服用しないこと。

＜用法・用量に関連する注意＞  
(1) 定められた用法・用量を厳守すること。  
(2) 本剤を服用の際は、アルコール飲料の摂取は控えること。

【成分】1回量(1瓶30mL)中ニザチジン75mg 添加物、エリスリトール、還元麦芽糖水アメス、スクロース、アセシルサリウムK、トレハロース、フェリシリン、ベンクエン酸Na、香料、エタノール、(ニリン、pH調節剤)2成分

【保管及び取扱い上の注意】  
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。  
(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。  
(3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になつたり品質が変わることがある。)  
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080  
受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

アシノンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。



# 胃酸の逆流 などに よる 胸やけ




有効成分  
ニザチジン  
配合

胃酸の出過ぎを  
コントロール

ストレス などによる  
胃酸の出過ぎ での 胃痛

飲みきり  
タイプ  
アセロラ風味




第1類医薬品

30mL×3本入

セルフメディケーション  
税 控除 対象

30mL×3本入



第1類医薬品

品名コード 3932



金属:キャップ  
ガラス:瓶  
すてるときは、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。