

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

水なしで飲める
下痢・食あたりに

第2類医薬品

《止瀉薬》

テイカエース 下痢止め

テイカエース下痢止めの特徴

- タンニン酸ベルベリンは、腸内でベルベリンとタンニン酸に分解され、殺菌作用と収れん作用により、細菌性の下痢や腸内の異常発酵による下痢に効果があります。
- ロートエキスは、消化管のけいれんによる腹痛を伴う下痢に効果があります。
- 本品は、口の中で溶かし、水なしで飲めるチュアブル錠です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含んでいます。)

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (5) 高齢者。
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 精神神経系 | 頭痛 |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 顔のほてり、異常なまぶしさ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

次の量を服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|-------------|------------------------------|
| 成人（15歳以上） | 2錠 | 3回を限度とし、かむか、口中で溶かして服用してください。 |
| 8歳以上15歳未満 | 1錠 | 服用間隔は4時間以上おいてください。 |
| 8歳未満 | 服用しないでください。 | |

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)8歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分・分量

〈1日量（6錠）中の含有成分〉

タンニン酸ベルベリン：300mg ロートエキス3倍散：180mg（ロートエキスとして60mg）

添加物：バレイショデンブ、D-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、タンニン酸、ポビドン、クロスポビドン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸水和物、l-メントール、香料、ステアリン酸Mg

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬原料を用いた製剤ですので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先(お客様相談係)

電話番号：076-431-8863[テイカ製薬(株)]
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元

ゲンキー株式会社
福井県坂井市丸岡町下久米田38-33
製造販売元

テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号