

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

歯痛剤 新今治水

歯痛剤
第2類医薬品

液剤タイプの「新今治水」は、カンフェニック処方（カンフル・フェノール・アルコールの配合）を応用してつくられた歯痛のお薬です。歯の痛いところに直接作用して、すみやかに痛みを鎮めます。

ご使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください。

歯ぐき、唇

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

むし歯・浮歯・歯の根の痛みを鎮める。

用法・用量

薬剤をしみ込ませた綿球を、むし歯の穴に押し込んでください。



【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法をおまもりください。
- 痛みのある歯の空洞以外の箇所には塗布しないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は歯科用におみ使用し、眼科用その他に使用しないでください。
- 本剤は歯の硬歯質（エナメル質・象牙質）を傷めますが、歯以外のところに余分についた場合には一時的に食味などを変化させることがあるのでガーゼ等でふきとってください。
- 誤ってのまわりや顔などについた場合は、ただちに水でよく洗ってふきとってください。

※本剤は、むし歯など歯の痛みの原因を治すことはできませんので、早めに歯科医師による根本的な治療をおすすめします。

成分・分量(100g中)

成分	分量	(はたらき)
チョウジ油	0.3 g	痛みを鎮めます。
フェノール	5.0 g	痛みを鎮め、殺菌します。
dI-カンフル	10.0 g	
ケイヒ油	2.5 g	痛みを鎮めます。
I-メントール	0.1 g	
ソフエンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	炎症を抑えます。
ソフカイン塩酸塩	0.1 g	
塩酸パラブアルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	0.03g	痛みを鎮めます。
サンシチンキ	15.07g	炎症を抑えます。

添加物としてプロピレングリコール、エタノールを含有します。 ●合成着色剤は使用していません。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

田平製薬株式会社
大阪府茨木市寄久住2丁目7番6号
田平製薬ビル（〒565-0821）0120-5500-61
9:00～17:00/12:00～13:00、土・日・祝日除く
http://www.tanpei.co.jp