

データベースの概要

添付文書に記載されている副作用の初期症状に関するデータベースです。

副作用の早期発見などのためにご利用いただくことが可能です。

本データベースは、医療用医薬品の添付文書に記載されている全ての副作用情報を網羅しています。

データベースの特徴

副作用の初期症状を分類

副作用毎に初期症状を登録し、その初期症状を「自覚症状」、「他覚症状」、「他覚症状」に分類しています。

【重大な副作用】【その他の副作用】など、添付文書の記載項目名の情報も保持しています。

例

『イノベロン錠200mg』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

皮膚粘膜眼症候群（**Stevens-Johnson症候群**）（頻度不明）皮膚粘膜眼症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、眼充血、紅斑、水疱・びらん、咽頭痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

「Stevens-Johnson症候群」のデータ（概略）

Stevens-Johnson症候群	
自	関節の痛み
自	頭痛
自	食欲がない
自	だるい
自	のどの痛み
自	尿をする時の痛み
自	口の中や結膜などの粘膜の痛み
自	便をする時の痛み
他	全身の皮膚が赤く腫れて湿疹ができる
他	水ぶくれができる
他	口の中や結膜などの粘膜のただれ
他	眼の充血
他	眼やにが出る
他	まぶたの腫れ
他	唇のただれ
他	皮膚がはがれる
他	眼が開けづらい
他	38℃以上の熱がでる
他	陰部のただれ

自覚症状

他覚症状

『ザクラス配合錠LD』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

横紋筋融解症：横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。

「横紋筋融解症」のデータ（概略）

横紋筋融解症	
自	だるい
自	手足のしこり
自	筋肉痛
自	手足の痛み
自	腰痛
自	肩の痛み
他	赤褐色の尿が出る
他	手足に力が入らない
他	筋肉がこわばる
他	手足の腫れ

自覚症状

他覚症状

『トリメク配合錠』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

ニューロパチー（頻度不明）、**錯乱状態**（1%未満）、痙攣（頻度不明）：ニューロパチー、錯乱状態、痙攣があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

「錯乱状態」のデータ（概略）

錯乱	
他	錯乱状態
他	錯乱様
他	精神錯乱
他	錯乱増強
他	可逆性の錯乱状態
他	可逆性錯乱状態
他	意識が乱れ正常な思考ができない

他覚症状

データベースの機能

初期症状から副作用を推測

副作用の初期症状を「自覚症状」、「自他覚症状」、「他覚症状」に分類しているため、服薬指導を行う相手に応じた確認を行うことが可能です。

また、初期症状から副作用の早期発見や原因となる薬品を特定することが可能です。

例

『リスパダールOD錠1mg』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

低血糖（頻度不明）：低血糖があらわれることがあるので、脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識障害等の低血糖症状が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。

『低血糖』のデータ（概略）

低血糖	
自	頭痛
自	だるい
自	動悸がする
自	寒気がする
自	冷や汗が出る
自	気分が悪くなる
自	立ちくらみがする
自	全身の力が抜ける感じがする
自	強い空腹感がある
自	眼がちらつく
自他	ふらつく
自他	気が遠くなる
自他	手の震え
自他	汗の量が増える
自他	体の震え
自他	ふらつきが回らない
自他	うとうとする
自他	脈が速くなる
自他	痙攣する
自他	吐き気・嘔吐
他	意識を失う
他	何を言っているのかわからない

患者さん本人に確認する症状

患者さん本人・患者さんの家族に確認する症状

患者さんの家族に確認する症状