

概要

添付文書に記載されている副作用の初期症状に関するデータベースです。

特徴

副作用疾患に対する初期症状を、「自覚症状」「自他覚症状」「他覚症状」に区分していますので、状況に応じたご利用が可能です。

例)

「Stevens-Johnson 症候群」の副作用の記載がある『ロキソニン錠 60mg』

『ロキソニン錠 60mg』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

3) 皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症：
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、
中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）があらわれる
ことがあるので、観察を十分に行い、異常が
認められた場合には～

「Stevens-Johnson 症候群」のデータ（概略）

Stevens-Johnson症候群	自	体がだるい
スティーブンス・ジョンソン症候群	自	関節の痛み
皮膚粘膜眼症候群	自	頭痛
Stevens-Johnson Syndrome	自	食欲が無い
	自	のどの痛み
	自	尿をする時の痛み
	自	口の中などの粘膜の痛み
	自	便をする時の痛み
	他	熱がでる
	他	全身の皮膚が赤く腫れて発疹ができる
	他	水ぶくれができる
	他	口の中・鼻の中・結膜などの粘膜がただれる
	他	眼の充血
	他	眼やにが出る
	他	まぶたの腫れ
	他	唇がただれる
	他	皮膚がはがれる
	他	眼が開けづらい
	他	38℃以上の熱がでる

「横紋筋融解症」の副作用の記載がある『リポバス錠 5』

『リポバス錠 5』の添付文書

【重大な副作用】

1) 横紋筋融解症（0.01%）、ミオパシ
ー（0.01%）：筋肉痛、脱力感、CK（C
PK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇
を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、これ
に伴って急性腎不全等の重篤な腎障害があ
らわれることがある。

「横紋筋融解症」のデータ（概略）

横紋筋融解症	自	体がだるい
横紋筋融解	自	手足のしびれ
	自	筋肉痛
	自	手足の痛み
	自	腰痛
	自	手足の腫れ
	自	肩の痛み
	他	赤褐色の尿が出る
	他	手足に力が入らない
	他	筋肉がこわばる

「錯乱状態」の副作用の記載がある『オメプラール錠 20』

『オメプラール錠 20』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

10) 錯乱状態（頻度不明）：せん妄、異常行
動、失見当識、幻覚、不安、焦躁、攻撃性等
があらわれることがあるので、異常が～

「錯乱状態」のデータ（概略）

錯乱	他	意識が乱れ正常な思考ができない
錯乱状態		
錯乱様		
精神錯乱		