

データベースの概要

効能・効果、副作用、使用上の注意、相互作用などに関する情報を、患者さんが理解しやすい表現を用いて作成したデータベースです。

薬剤情報提供書やお薬手帳などの患者さんへの情報提供にご利用いただくことが可能で、英語にも対応しています。

データベースの特徴

英語に対応

効能・効果、重篤副作用初期症状、使用上の注意（適用上の注意、保管上の注意、妊娠・授乳に関する注意、職業に関する注意、医療用医薬品相互作用、飲食物相互作用）、使用タイミングなどに関する情報は、英語にも対応しています。

それぞれ英語版の内容と日本語版の内容が1：1となっているため、患者さんへの情報を確認した上でご提供いただくことが可能です。

効能・効果（日本語版／英語版）

添付文書の【効能・効果】【薬効薬理】やその他の文献を参考に、それぞれの薬品の効能・効果について、患者さんが理解しやすい表現を用いて説明文を作成しています。「効果」と「作用」の文章を、状況により組み合わせてご利用いただくことが可能です。

例

『ゼチーア錠 10mg』の添付文書（抜粋）

【効能又は効果】

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症、ホモ接合体性シトステロール血症

【薬効薬理】

エゼチミブは食事性及び胆汁性コレステロールの吸収を阻害する。エゼチミブの作用部位は小腸であり、ハムスター等を用いた動物試験において、小腸でのコレステロールの吸収を選択的に阻害し、その結果、肝臓のコレステロール含量を低下させ、血中コレステロールを低下させた。

日本語版表示例

効果	脂質異常症を治療するお薬です。
作用	小腸からのコレステロールの吸収をおさえ、血液中のコレステロールの量を減らす働きがあります。

英語版表示例

indication	This is a medicine to treat hyperlipidemia.
effect	It blocks cholesterol absorbed from the small intestine, and lowers its level in the blood.

患者さんに伝える情報として慎重に検討すべき抗がん剤などに関しては、直接的ではない説明文もあわせて作成しています。

例

日本語版表示例

あなたの病気や症状に合わせて処方されたお薬です。

英語版表示例

This is an individualized prescription for your disease/symptom.

副作用

添付文書の膨大な副作用情報の中から、頻度の高い副作用や薬品に特徴的な副作用を抽出しています。
なお、症状を自覚しにくい副作用や検査値の変化は除外しています。

例

自覚しやすい副作用や頻度の高い副作用を抜粋して表示することが可能です。

『レキップC R錠8mg』の添付文書（抜粋）

11. 副作用			
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。			
11.1 重大な副作用			
11.1.2 幻覚（13.7%）、妄想、興奮、錯乱（いずれも頻度不明）、譫妄（0.6%）			
幻覚、妄想、興奮、錯乱、譫妄等の精神症状があらわれることがある。[10.2参照]			
11.2 その他の副作用			
	5%以上	5%未満	頻度不明
* 過敏症		発疹、痒疹	蕁麻疹、血管性浮腫等
* 精神系		リビドー亢進	病的賭博、強迫性購買、暴食、攻撃性、躁状態
神経系	傾眠、ジスキネジア	めまい	失神
血管障害		起立性低血圧	低血圧
胃腸障害	悪心、便秘	腹痛、嘔吐、消化不良	
その他		末梢性浮腫	薬剤離脱症候群 ^[1] （無感情、不安、うつ、疲労感、発汗、疼痛等）

表示例

やたらに体を動かす、顔をしかめる、幻覚、吐き気・嘔吐、便秘、歩きづらくなる、眠くなるなどの症状が現れることがあります。

重篤副作用初期症状（日本語版／英語版）

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）から発表された「重篤副作用疾患別対応マニュアル」に記載されている副作用について、初期症状を作成しています。

例

『ロコアテープ』の添付文書には、重篤副作用疾患別対応マニュアルに記載されている副作用の「スティーヴンス・ジョンソン症候群」と同義語の「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）」が記載されており、これらの初期症状を表示することが可能です。

『ロコアテープ』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、**皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）**、剥脱性皮膚炎：中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、剥脱性皮膚炎（いずれも頻度不明）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

日本語版表示例

熱がでる
全身の皮膚が赤く腫れて湿疹ができる
唇や口の中がただれる
眼の充血

英語版表示例

to develop fever
skin over the entire body is swollen red, and a rash breaks out
lips and mouth are ulcerated
redness of the eye

使用上の注意（日本語版／英語版）

添付文書の使用上・保管上の注意に関する情報に対して、患者さんに理解しやすい文章への変更や、文章の補足などを行っています。

例

『ノボラピッド30 ミックス注 フレックスペン』

添付文書（抜粋）

【重要な基本的注意】

低血糖を起こすことがあるので、**高所作業、自動車の運転等**に従事している患者に投与するときには注意すること。

日本語版表示例

（大人用の表示例）

運転などの危険を伴う作業を行う際には十分に注意して下さい。

（子供用の表示例）

自転車や高い所での遊びなどには十分に注意して下さい。

英語版表示例

（大人用の表示例）

Be very careful if you are engaged in dangerous work such as driving a vehicle.

（子供用の表示例）

Be very careful if your child rides a bicycle or plays on high places.

添付文書（抜粋）

【適用上の注意】

投与時

本剤は**懸濁製剤**であるので、**次の手順で十分に混和し均一にした後、使用**すること。

日本語版表示例

よく振ってから使用して下さい。

英語版表示例

Shake well before using.

添付文書（抜粋）

貯法：**凍らせない**ようにして、**冷蔵庫**で保管して下さい。

日本語版表示例

凍らせないようにして、冷蔵庫で保管して下さい。

英語版表示例

Store it in a refrigerator without freezing.

相互作用（日本語版／英語版）

相互作用情報について、患者さんに理解しやすい表現への変更や、文章の補足などを行っています。
「医薬品に関する注意」と「飲食物に関する注意」に対応しています。

医薬品に関する注意（日本語版／英語版）

例

『デカドロン錠0.5mg』の添付文書（抜粋）

【併用注意】

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
マクロライド系抗生物質： エリスロマイシン アゾール系抗真菌剤： イトラコナゾール	副腎皮質ホルモン剤の作用 が増強されるとの報告があ る。	本剤の代謝が阻害されるおそれがある。
HIVプロテアーゼ阻害剤： リトナビル	本剤のAUCの上昇あるいは これらの薬剤のAUCが低下 するおそれがある。	チトクロームP450に対して競合する可 能性がある。また、本剤がチトクローム P450を誘導することより、これらの薬剤 の代謝が促進される可能性がある。

日本語版表示例

抗生物質のうち<マクロライド系>に分類される薬
抗菌剤のうち<アゾール系>に分類される薬
ウイルス薬のうち<プロテアーゼ阻害剤>に分類されるもの

英語版表示例

antibiotic classified as <macrolide>
antimicrobial agent classified as <azole>
antiviral medicine classified as <protease inhibitor>

処方薬における相互作用の発現事象についても、患者さんが理解しやすい表現に変更しています。

例

『スタレボ配合錠L50』の添付文書（抜粋）

【併用注意】

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
NMDA受容体拮抗剤 メマンチン等	本剤の作用を増強するおそ れがある。	これらの薬剤により、ドパミン 遊離が促進する可能性がある。

日本語版表示例

『スタレボ配合錠L50』⇔『メモリーOD錠5mg』（メマンチン塩酸塩錠）
上記の薬品と一緒に使用すると、ときに“効き目が強くなる”場合があるので、
不快な症状やいつもと違うと感じたら、すぐに医師や薬剤師にご連絡ください。

英語版表示例

“Stalevo” ⇔ “Memory OD” (Memantine hydrochloride)
When you use the above medicines together, “The efficacy becomes stronger.”, so if
symptoms that are different from usual are seen, please consult a physician or a
pharmacist.

■ 飲食物に関する注意（日本語版／英語版）

例

『イスコチン錠100mg』の添付文書（抜粋）

【併用注意】		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ヒスチジンを多く含有する魚 マグロ等	頭痛、紅斑、嘔吐、そう痒等の ヒスタミン中毒を起こすことが ある。	本剤のヒスタミン代謝酵素阻害作用に より、体内にヒスタミンが蓄積すると 考えられている。
チラミンを多く含有する食物 チーズ等	血圧上昇、動悸があらわれるこ とがある。	本剤のMAO阻害作用により、チラミ ンは不活性化されず、アドレナリン作 動性神経終末部において蓄積されてい るカテコールアミンの遊離を促進する と考えられている。

日本語版表示例

下記の飲食物や生活上で使うものを一緒に使用すると、薬の効果に影響をおよぼすことがあるので、いつもと違う症状などがみられた場合は、医師や薬剤師にご相談ください。

ヒスチジン（アミノ酸の一種）を含むもの<かつお、まぐろ、ぶり（はまち）、大豆、小麦
など>
チラミンを含むもの<コーヒー、そら豆、チーズ、ビール、赤ワイン など>



英語版表示例

When the following foods, drinks and daily life items are used together, an influence is exerted on the effect of the medicine, so if symptoms that are different from usual are seen, please consult a physician or a pharmacist.

things containing histidine (an amino acid) (e.g. bonito, tuna, yellowtail (young yellowtail), soybean, and wheat)
things containing tyramine (e.g. coffee, fava bean, cheese, beer, and red wine)

データベースの機能

薬剤情報提供を支援

患者さんが薬を正しく使用するための薬剤情報提供書やお薬手帳などにご利用いただくことが可能です。また、各種文書発行時に患者さんにあわせた情報を選択してご利用いただけます。

使用にあわせた記載内容の選択

「薬を使う時」「薬を使った後」「薬を使っている間の生活上の注意」など、使用上の注意の内容を区分した情報を保持しています。

添付文書の情報を羅列するだけでは煩雑になりやすい膨大な情報の中から、薬品の使用にあわせて、情報提供のON/OFF（表示／非表示）を設定することが可能です。

例

『アミティーザカプセル2 4μg』の添付文書（抜粋）

【適用上の注意】			
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕			

使用上の注意	情報提供		
	薬を使うとき	薬を使った後で	薬を使っている間の生活上の注意
お薬は包装から取り出して服用して下さい。	ON OFF	ON OFF	ON OFF

例

『レルベア1 0 0 エリプタ3 0 吸入用』の添付文書（抜粋）

【適用上の注意】			
吸入後 本剤吸入後に、うがいを実施するよう患者を指導すること（口腔咽頭カンジダ症又は嚔声の予防のため）。ただし、うがいが困難な患者には、うがいではなく、口腔内をすすぐよう指導すること。			

使用上の注意	情報提供		
	薬を使うとき	薬を使った後で	薬を使っている間の生活上の注意
吸入後はうがいをして下さい。 うがいが困難な場合は、口の中をすすいで下さい。	ON OFF	ON OFF	ON OFF

例

『アデムパス錠 1. 0 mg』の添付文書（抜粋）

【特定の背景を有する患者に関する注意】

喫煙者
禁煙させることが望ましい。 非喫煙者に比べて本剤の血漿中濃度が低下する。

使用上の注意	情報提供		
	薬を使うとき	薬を使った後で	薬を使っている間の生活上の注意
使用中は禁煙して下さい。	ON OFF	ON OFF	ON OFF

性別にあわせた選択

妊婦や授乳婦に対する注意喚起の内容は、原則として成人女性のみに必要な情報です。男女どちらか一方に対する注意喚起の情報について、患者さんの性別による情報提供のON/OFF（表示／非表示）を設定することが可能です。

例

『レブラミドカプセル 5 mg』の添付文書（抜粋）

【警告】

本剤は精液中へ移行することから、**投与終了4週間後まで、性交渉を行う場合は極めて有効な避妊法の実施を徹底（男性は必ずコンドームを着用）**させ、避妊を遵守していることを十分に確認すること。

【特定の背景を有する患者に関する注意】

生殖能を有する者
投与開始予定4週間前から投与終了4週間後まで、性交渉を行う場合はパートナーと共に極めて有効な避妊法の実施を徹底（男性は必ずコンドームを着用）させ、避妊を遵守していることを十分に確認すること。

妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。カニクイザルでの生殖発生毒性試験では、妊娠中にレナリドミドを投与された母動物の胎児に奇形が認められた。レナリドミドはヒトで催奇形性を有する可能性がある。

使用上の注意	情報提供	
	男性	女性
妊娠およびその可能性がある方は、この薬を使用することはできません。	ON OFF	ON OFF
妊娠する可能性のある方は、この薬の使用前4週間から使用後4週間までは避妊して下さい。	ON OFF	ON OFF
男性は、この薬を使用中および使用を中止してから4週間は避妊するようにして下さい。	ON OFF	ON OFF

例

『ワーファリン錠 1mg』の添付文書（抜粋）

【特定の背景を有する患者に関する注意】

授乳婦

本剤投与中の授乳婦には**授乳を避けさせる**こと。ヒト母乳中に移行し、新生児に予期しない出血があらわれることがある。

使用上の注意	情報提供	
	男性	女性
この薬を使用される方は、授乳を行わないで下さい。	ON/ OFF	ON /OFF

患者属性による注意情報の選択

併用する飲食物や投与経路の禁止および限定に対する注意喚起の内容について、患者属性により情報を選択して提供することが可能です。

例

■ 飲食物との相互作用

『ジルテックドライシロップ 1.25%』の添付文書（抜粋）

【併用注意】

アルコール

使用上の注意	情報提供				
	小児	一般	高齢者	男性	女性
次のものはこのお薬との飲み合わせに注意が必要です アルコールを含むもの<ジン、ウオッカ、ラム、ウイスキー、ブランデー など>	ON/ OFF	ON /OFF	ON /OFF	ON /OFF	ON /OFF

例

■ 投与経路の禁止

『ラキソベロン内用液 0.75%』の添付文書（抜粋）

【適用上の注意】

薬剤投与時の注意：**眼科用（点眼）として使用しない**こと。

使用上の注意	情報提供				
	小児	一般	高齢者	男性	女性
目には使用しないで下さい。	ON /OFF	ON /OFF	ON /OFF	ON /OFF	ON /OFF

例

■投与経路の限定

『ボルタレンサボ 2.5 mg』の添付文書（抜粋）

【適用上の注意】

使用時：直腸投与による外用にのみ使用すること。

使用上の注意	情報提供				
	小児	一般	高齢者	男性	女性
お薬は指示を守って正しくお使い下さい。 それ以外の使用はおやめ下さい。	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF

英語による薬剤情報提供の支援

英語に対応した各種データを用いることで、英語による薬剤情報提供書を作成することが可能です。

例

『ドラル錠 15』のデータ（概略）

日本語版表示例

項目	薬剤情報
商品名	ドラル錠 15
一般名	クアゼパム錠
規格	15 mg 1錠
色調	淡橙
投与経路	経口
使用タイミング	就寝直前
効能効果	寝つきが悪い、熟睡できないなどの不眠症状を改善するお薬です。
重篤副作用 初期症状	ろれつが回らない／手足がうまく動かない
作業（職業）上の注意	翌朝以降もお薬の影響が出る場合があります。運転などの危険を伴う作業は避けて下さい。
適用上の注意	食後の服用は避けて下さい。
相互作用に関する注意	<リトナビル> という成分を含む薬
飲食物との注意	アルコールを含むもの<ジン、ウオッカ、ラム、ウイスキー、ブランデー など>
妊婦への注意	妊娠およびその可能性がある方は、治療上必要な場合に限り、使用するお薬です。
授乳婦への注意	この薬を使用される方は、授乳を行わないで下さい。
保管上の注意	光の当たらない所で、湿気を避けて保管して下さい。



英語版表示例

Category	Drug information
Brand name	Doral
Generic name	Quazepam
Specification	15 mg/1 tablet(s)
Color	pale orange
Route of administration	oral
Timing of the dosage	just before going to sleep
Indications	This is a medicine to improve insomnia symptoms such as having trouble getting to sleep and lack of deep sleep.
Clinically significant adverse reactions initial symptom	slur words/cannot move arms and legs very well
Attention in the work and occupation	The medicine may affect you even on and after the next morning. Avoid dangerous work such as driving a vehicle.
Precautions concerning use	Do not take it after meals.
Precautions for drug interaction	medicine containing an ingredient called <ritonavir>
Food/Drink interactions	things containing alcohol (e.g. gin, vodka, rum, whisky, and brandy)
Precautions for use during pregnancy	This is a medicine that should be used by a pregnant woman or a woman of childbearing potential only when it is needed for treatment.
Precautions for use during lactation	Anyone who uses this medicine should not breastfeed a child.
Precautions of storage	Store it away from sunlight and moisture.

高品質な医薬品情報データベースで様々な課題を解決

データインデックスの医薬品情報データベースは、薬剤師や専門スタッフによる日々のメンテナンスと独自の情報処理技術を基盤としています。
豊富な情報量と高い品質を兼ね備え、医薬品情報によって病気の治療や健康をささえる「情報医療」の推進に貢献します。

詳しくはこちらから → <https://www.data-index.co.jp/>