

OTC医薬品添付文書DB

■ 概要

- ・ OTC医薬品における「テキスト版」、「PDF版」の添付文書情報のデータベースです。
- ・ 添付文書の記載内容の参照および検索などにご利用いただくことが可能です。

■ 特徴・機能

- ・ OTC医薬品約12,000品目を収載しており、医薬品コード（当社独自コード）で管理しています（2025年4月現在）。
- ・ テキスト形式では、添付文書の【成分・含量】【用法・用量】【効能・効果】の項目の情報を保持しており、項目毎に表示や検索を行うことが可能です。

■ 目的・利用場面

- ・ テキスト版を使用することで目的に合った自由なレイアウトでの表示が可能なため、医療機関システムや調剤薬局システムにおいてDI検索にご利用いただけます。
- ・ 調剤や服薬指導時の参照用として、PDF版を用いて実際の添付文書を確認することが可能です。

■データ例

『ロキソニンSプレミアム』の添付文書情報（抜粋）

※2024年10月
(使用上の注意改訂)
解熱鎮痛薬

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要に応じて読めるよう大切に保管して下さい。

第1類医薬品 つらい痛みを速効・胃を守る成分
つらい頭痛に **ロキソニンSプレミアム** (頭痛・生理痛)

「ロキソニンSプレミアム」は、「速効・効きめ、やさしさ」の3つを同時に追求した解熱鎮痛薬です。

ロキソニンSプレミアムの特徴

- つらい痛みをすばやく効く鎮痛成分（ロキソプロフェナトリウム水和物）に、アリルイソプロピルアセチル尿素を配合。鎮痛効果を高めます。
- さらに無水カフェインを配合。鎮痛効果を助けます。
- メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを配合。胃粘膜保護作用により、胃を守ります。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 本剤のような解熱鎮痛薬を服用後、過度の体温低下、虚脱（力が出ない）、四肢冷却（手足が冷たい）等の症状があらわれた場合

(2) 服用後、消化性潰瘍、むくみがあらわれた場合

また、まれに消化管出血（血を吐く、吐き気・嘔吐、腹痛、黒いゲル状の便、血便等があらわれる）、消化管穿孔（消化管に穴があくこと、吐き気・嘔吐、激しい腹痛等があらわれる）、小腸・大腸の狭窄・閉塞（吐き気・嘔吐、腹痛、腹部膨満等があらわれる）の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

(3) 服用後、次の症状があらわれた場合

副作用	症状
皮膚部	発疹・発赤、かゆみ
消化器	腹痛、胃部不快感、食欲不振、吐き気・嘔吐、腸管痙攣、胸やけ、口内炎、消化不良
循環器	血圧上昇、心悸
精神神経系	異常な興奮、しびれ、めまい、頭痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわら、便秘、下痢

4. 1〜2週間服用しても症状がよくなる場合（他の疾患の可能性も考えられる）は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

■ 効能・効果

○頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛

○悪寒・発熱時の解熱

■ 用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠 	2回まで。 症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。 服用間隔は4時間以上おいて下さい。
15歳未満	服用しないで下さい。	

(用法・用量に関連する注意)

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

■ 成分・分量

本剤はごく薄い紅色のフィルムコーティング錠で、2錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
ロキソプロフェナトリウム水和物	68.1mg (無水物として60mg)	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】をおさえます。
アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg	痛みをおさえる効果を高めます。
無水カフェイン	50mg	痛みをおさえるはたらきを助けます。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	100mg	胃粘膜を保護するはたらきがあります。

添加物：乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、三酸化鉄、カルナック/パコフ

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00〜17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

効能・効果

頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛。

悪寒・発熱時の解熱。

用法・用量

成人（15歳以上）：1回2錠。

1日2回服用まで。

症状が現れた時、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用して下さい。

但し、再度症状が現れた場合には3回目を服用できます。

服用間隔は4時間以上おいてください。

15歳未満：服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守して下さい。

2. 錠剤の取り出し方

添付文書図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

成分・含量

2錠中

ロキソプロフェナトリウム水和物 68.1mg（無水物として60mg）、アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg、無水カフェイン 50mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 100mg