

患者向け薬の説明DB（薬剤情報提供書版）

■ 概要

- ・医療用医薬品の、効能・効果、副作用、注意事項、相互作用、薬剤識別に関する情報を、患者さんが理解しやすい表現を用いて作成したデータベースです。
- ・薬剤情報提供書やお薬手帳などの患者さんへの情報提供にご利用いただくことが可能です。
- ・新規収載医薬品の告示や添付文書改訂時などの情報を迅速に反映しており、最新の情報をご利用いただけます。

■ 特徴・機能

- ・患者さん向けにわかりやすく簡潔な表現を使用しています。
- ・効能・効果データは、『詳しい説明』と『簡単な説明』を保持しており、ご利用場面に応じた使い分けが可能です。
- ・副作用データは、主な副作用（頻度が高く特徴的な副作用）、直ちに対処すべき副作用（即時中止、直ちに対処が必要な症状や対応）、重大な副作用（初期症状）のデータを保持しています。
- ・注意事項データは、服用方法、生活上の注意など9個の属性区分により必要な注意事項の選択や制御が容易であるほか、年齢・性別に応じた出力制御が可能です。
- ・相互作用データは、併用できない医薬品、飲食物についてわかりやすく記載しています。

■ 目的・利用場面

- ・薬剤情報提供書、お薬手帳、薬袋などにご利用いただけます。
- ・服薬指導の支援にご利用いただけます。
- ・一般の方向けアプリ等の薬剤情報コンテンツとしてご利用いただけます。

■データ例（効能・効果）

『リベルサス錠3mg』のデータ（概略）

効能・効果 (簡単な説明)	血糖値を下げる薬です。
効能・効果 (詳しい説明)	血糖値を下げる薬です。 インスリンの分泌を促すホルモン(インクレチン)と同様の働きをすることにより、血糖値を下げます。

■データ例（副作用）

『リベルサス錠3mg』のデータ（概略）

主な副作用	低血糖、気持ちが悪い、下痢、食欲がない、便秘、吐く、腹部不快感、腹痛、リパーゼ増加、糖尿病網膜症、頭痛等が現れることがあります。
直ちに対処すべき副作用	持続的な激しい腹痛や吐き気等が現れた場合は急性膵炎の可能性があるので、速やかに医師の診察を受けて下さい。 甲状腺に関連する症状(首に触れると硬いしこりがあるなど)が現れた場合は、すぐに医師、薬剤師に連絡して下さい。
重大な副作用	発熱、寒気がする、気分が悪い、冷や汗が出る、体がだるい、強い空腹感、かゆみ、皮膚や白目が黄色い、…(以下略)。

■データ例（注意事項・患者属性別）

『リウマトレックスカプセル2mg』のデータ（概略）

注意コメント	男性は服用中及び服用終了後3カ月間は必ず避妊して下さい。	女性は服用中及び服用終了後1月経周期は必ず避妊して下さい。
年齢上限	—	60歳
年齢下限	15歳	15歳
性別	男性	女性
属性区分	生活上の指示、指導、注意	

■データ例（相互作用）

『プログラフ顆粒0.2mg』のデータ（概略）

一緒に服用 できないくすり	高血圧、心臓、むくみの薬の一部 (カリウム保持性利尿薬)
	肺高血圧の薬 ポセンタン
一緒に摂取 できない飲食物	健康食品(セイヨウオトギリソウ含有食品): 服用期間中は避けること。効き目が弱くなる ことがあります
	カンナビジオール(CBD)含有製品: 服用期間中は避けること。副作用が出る ことがあります

■ システム、Web等での表示例（薬剤情報提供書）

デベルザ錠20mg/トホグリフロジン水和物錠

写真

1回1錠 朝食前 1日1錠
 剤形：フィルムコーティング錠
 色：薄い黄色
 本体コード：Kowa 122

【効能・効果】

血糖値を下げる薬です。
 血液中の余分なブドウ糖を尿中に排泄することにより、血糖値を下げます。

【副作用】

口が渇く、尿の回数が多い、低血糖、尿路感染、多尿、便秘、空腹、めまい、性器感染、血中ケトン体増加等が現れることがあります。

【注意】

- 薬の作用により尿量が増えたり尿の回数が多くなり、体液量が減少することがあるので、医師の指示に従って適度な水分補給をして下さい。
- 低血糖症状(めまい、ふらつき、冷や汗、震え等)が起こることがあるので、高所での作業や車の運転など危険を伴う作業には十分注意して下さい。
- 尿検査や血液検査の結果に影響を及ぼすことがあるので…。

データベースを用いた薬剤情報提供書の例示です。配置等レイアウトはユーザー様にて設定をお願いいたします。