

OTC医薬品添付文書DB

■ 概要

- ・ OTC医薬品における添付文書情報のデータベースです。
- ・ 添付文書の記載内容の参照および検索などにご利用いただくことが可能です。

■ 特徴・機能

- ・ OTC医薬品約11,000品目を収載しており、当社独自コードの「ブランドコード」で管理しています（2026年1月現在）。
- ・ 添付文書のPDFを保持しております。
- ・ テキスト形式では、添付文書の【効能効果テキスト】【用法用量テキスト】【成分テキスト】の項目の情報を保持しており、項目毎に表示や検索を行うことが可能です。

■ 目的・利用場面

- ・ テキスト形式を使用することで目的に合った自由なレイアウトでの表示が可能のため、医療機関システムや調剤薬局システムにおいてDI検索にご利用いただけます。
- ・ 調剤や服薬指導時の参照用として、PDFを用いて実際の添付文書を確認することが可能です。

■データ例

『ロキソニンSプレミアム』の添付文書情報（抜粋）

※2024年10月
（使用上の注意改訂）
解熱鎮痛薬

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に速くお読み下さい。

第1類医薬品 つらい痛みに速効+胃を守る成分

つらい頭痛に **ロキソニンSプレミアム**（頭痛・生理痛）

「ロキソニンSプレミアム」は、「速効、効きめ、やさしさ」の3つを同時に追求した解熱鎮痛薬です。

ロキソニンSプレミアムの特徴

- つらい痛みをすばやく効く鎮痛成分（ロキソプロフェナトリウム水和物）に、アリルイソプロピルアセチル尿素を配合。鎮痛効果を高めます。
- さらに無水カフェインを配合。鎮痛効果を助けます。
- メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを配合。胃粘膜保護作用により、胃を守ります。

3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が現れた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき、便秘、下痢

4.1〜2週間服用しても症状がよくならない場合（他の疾患の可能性も考えられる）は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

■ 効能・効果

- 頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

■ 用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠 	2回まで。 症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。
15歳未満	服用しないで下さい。	

(用法・用量に関連する注意)
(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

■ 成分・分量

本剤はごくわずかに紅色のフィルムコーティング錠で、2錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
ロキソプロフェナトリウム水和物	68.1mg (無水物として60mg)	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】をおさえます。
アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg	痛みをおさえる効果を高めます。
無水カフェイン	50mg	痛みをおさえるはたらきを助けます。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	100mg	胃粘膜を保護するはたらきがあります。

添加物：乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、三酸化鉄、カルナウバロウ

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせします。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00-17:00（土、日、祝日を除く）
<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

効能効果テキスト

- 頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

用法用量テキスト

- 年齢・・・1回量・・・1日服用回数
- 成人（15歳以上）・・・2錠・・・2回まで。症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。
- 15歳未満・・・服用しないで下さい。

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

成分テキスト

- 本剤はごくわずかに紅色のフィルムコーティング錠で、2錠中に次の成分を含有しています。
- 成分・・・分量・・・はたらき
- ロキソプロフェナトリウム水和物・・・68.1mg（無水物として60mg）・・・炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】をおさえます。
- アリルイソプロピルアセチル尿素・・・60mg・・・痛みをおさえる効果を高めます。
- 無水カフェイン・・・50mg・・・痛みをおさえるはたらきを助けます。
- メタケイ酸アルミン酸マグネシウム・・・100mg・・・胃粘膜を保護するはたらきがあります。

添加物：乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、三酸化鉄、カルナウバロウ

