

OTC薬の説明DB

■ 概要

- ・ OTC医薬品の一般の方向けの薬の説明データベースです。
- ・ OTC医薬品の各種情報を1テーブルにまとめており、システムやアプリに搭載しやすくしています。

■ 特徴・機能

- ・ OTC医薬品を特定するだけで、該当OTC医薬品の全情報を確認することが可能です。
- ・ タグ情報を用い、注目する情報を効率良く抽出することが可能です。

■ 目的・利用場面

- ・ お薬検索アプリなど、OTC医薬品の検索・情報表示にご利用いただけます。
- ・ 調剤薬局システムやドラッグストアのシステムにおいて、販売時の服薬指導の補助やお薬手帳の貼付用・説明文の印刷用にご利用いただけます。

■ データ構成

基本情報	ブランドコード*、製品名、会社名、成分・分量、医薬品区分、分類名**、JANコード・包装単位、剤形、効能・効果
服用に関する情報	用法・用量、使用上の注意、副作用情報
生活上の注意	飲食物・嗜好品への注意、車の運転・危険な作業への注意
飲み合わせ	併用できない薬、相談が必要な薬
その他の情報	問い合わせ先、保管及び取扱い上の注意

* 当社で独自に付与した製品コード

** 当社で独自に作成した分類

■ システム、Web等での表示例

製品名: ロキソニンS

効能・効果

- 頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。
 年齢・・・1回量・・・1日服用回数
 成人（15歳以上）・・・1錠・・・2回まで。症状があらわれた時、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいて下さい。
 15歳未満・・・服用しないで下さい。

（1）用法・用量を厳守して下さい。

（2）錠剤の取り出し方：図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

JANと包装単位

4987107610867 : 12錠 : 0円*

*オープン価格

会社名	第一三共ヘルスケア
医薬品区分	一般用医薬品(第1類)
分類名	解熱鎮痛薬
剤形	内用錠

このくすりが使えない人

かぜ薬や解熱鎮痛薬を使用して
 ぜんそくを起こしたことがある人。

15歳未満の小児。	胃潰瘍の人。
十二指腸潰瘍の人。	肝臓病の人。
腎臓病の人。	心臓病の人。

医師から血液異常を指摘されている人（赤血球が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ない等）。

出産予定日12週以内の妊婦。