


◀ 日本薬局方 ▶ 1.1130



クレゾール石ケン液 「カナダ」

SOLUTIO CRESOLI SAPONATA M



製造発売元

合名会社 金田直隆商店

大阪市東区道修町1丁目12

N.KANADA & CO.,

【組成・性状】

1ml中 クレゾール0.5mlを含有する黄かっ色～赤かっ色の粘性のある石ケン液 (50v/v%)

【作用】

本剤は使用濃度において抗酸菌を含む通常の細菌には有効であるが、芽胞および大部分のウイルスに対する殺菌効果はほとんど期待できない。

【用法・用量】

- クレゾールとして、下記の濃度に希釈して使用する。
- 手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒
医療用具の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒……………0.5～1% (本剤の50～100倍希釈液)
 - 排泄物の消毒……………1.5% (本剤の33倍希釈液)
 - 瘻の消毒……………0.1% (本剤の500倍希釈液)

【適用】

- 手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒
医療用具の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒、排泄物の消毒。● 瘻の消毒。

【使用上の注意】

1. 次の部位には使用しないこと —— 損傷皮膚
2. 副作用
過敏症 紅斑等の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。
3. 適用上の注意
 - 1) 人体
 - ア. 経口投与しないこと。
 - イ. 眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
 - ウ. 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には、刺激症状を起こすことがあるので、直ちに拭きとり石けんと水でよく洗い流すこと。
 - エ. 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
 - オ. 長期間又は広範囲に使用しないこと。
 - 2) その他
 - ア. 希釈する水にアルカリ土類金属塩、重金属塩、第二鉄塩、酸類が存在する場合変化することがあるので注意すること。存在
 - イ. 本剤は常水で希釈すると次第に凝濁して沈殿することがあるが、このような場合には上澄み液を使用すること。

【取扱い】
 注意—長期保存により、色が濃くなることもある。
 (クレゾールの物性による。)
 貯法—しゃ光した気密容器。

健保適用

Lot.