

漢方製剤

コウジン末 鈴

Red Ginseng Powd. "Suzu"

貯法：密閉容器

生薬であるので高温多湿の場所を
避け、なるべく湿気の少ない、涼
しい所に保管すること。

承認番号	(61AM) 4376
薬師収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- 1) 高熱のある患者
 - 2) 浮腫や尿量減少のある患者
 - 3) 実証者で不眠症や煩燥症状のある患者
 - 4) 炎症症状のある患者
- （これらの症状を悪化させるおそれがある）

【組成・性状】

組成

販売名	コウジン末 鈴
成分・含量 (1g中)	日本薬局方 コウジン1gを含有

性状：淡灰褐色～淡褐色の粉末で、特異なおいがあり、味は初めわずかに甘く、後にやや苦い。
鏡検するとき大小不同で不整形の糸細胞が散在し、でんぷん粒は全くのり化している。また、
網紋道管及び環紋道管を含む。更に黄色の塊状の分泌物を含有する薄膜細胞の破片を認める。

【効能・効果】

漢方処方調剤に用いる。

【用法・用量】

漢方処方調剤に用いる。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 高血圧の患者 [虚寒の症状のある高血圧症に限り投与してよいが、投与量は最小量とし、投与後1時間前後安静にさせる。しかし最高血圧が180mmHg以上の者には投与を避ける。]
- (2) 化膿性疾患のある患者 [症状を悪化させるおそれがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類 \ 頻度	頻度不明
過敏症	湿疹
長期連用	頭痛、不眠、動悸、血圧上昇

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 妊婦への投与

行血興奮作用があるので、少量から投与を開始し、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

【包装】

500g

製造・発売

鈴粉末薬品株式会社

大阪市中央区道修町 3丁目4番11号