

外用局所収れん剤
日本薬局方

酸化亜鉛

酸化亜鉛「ケンエー」

Zinc Oxide

500g

【使用上の注意】

- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
 - 過敏症：過敏症状（頻度不明）があらわれた場合には使用を中止すること。
 - 皮膚：発疹、刺激感（頻度不明）等の症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。
2. 適用上の注意
- 投与経路：眼には使用しないこと。
 - 使用時：誤って吸入しないよう注意させること。

製造番号

使用期限




外用局所収れん剤

日本薬局方

酸化亜鉛

酸化亜鉛「ケンエー」



Zinc Oxide

500g

貯法：気密容器
至温保存

 **健栄製薬株式会社**
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

2000年8月作成（新様式第1版）
日本標準商品分類番号 872621

承認番号	薬価収載	販売開始	再評価結果
(61AM)1520		1986年3月	1979年2月

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】

- 重度又は広範囲の熱傷【酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。】
- 患部が湿潤している場合【酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。】

【組成・性状】

〈組成〉

1g中 日局酸化亜鉛 1g含有。

〈性状〉

白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。
空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の取れん・消炎・保護・緩和な防腐

【用法・用量】


- 外用散剤（散布剤）として……………15～100%
 - 軟膏剤・液剤（懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等）として……………2～60%
- 上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1～数回患部に適用する。

〈調剤包装単位用コード〉



01111111011111

〈販売包装単位用コード〉



01111111011111