

日本薬局方

劇薬

ヨードチンキ

Iodine Tincture

500mL

殺菌消毒剤

販売

※製造販売

岩城製薬株式会社 小堺製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2 東京都墨田区両国4-36-9

使用期限

製造番号

※2012年4月
製造販売業者の住所変更に伴う改訂等(第2版)
2010年11月作成(第1版)

<貯法>保存条件 火気を避けて室温保存。
容器 気密容器
<販売名>ヨードチンキ「コザカイ・M」

第二石油類
危険等級Ⅲ
水溶性
火気厳禁

日本標準商品分類番号 872612

承認番号	16000AMZO4520000
薬価収載	1950年10月
販売開始	2010年11月
再評価結果	1983年 4月

【禁忌】(次の患者には使用しないこと。)
ヨード過敏症の患者

【組成・性状】

本品100mL中に、日本薬局方 ヨウ素6gを含有する。添加物として、ヨウ化カリウム、エタノールを含有する。本品は暗赤褐色の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

- 1.皮膚表面の一般消毒
- 2.創傷・潰瘍の殺菌・消毒
- 3.歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒

【用法・用量】

5～10倍に希釈し、1日2～3回患部及び皮膚に適量塗布する。

【使用上の注意】

- 1.副作用(本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	ヨード疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合は
使用を中止すること。

- 2.臨床検査結果に及ぼす影響
血漿たん白結合ヨード(PBI)及び甲状腺放射性ヨード摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。
- 3.適用上の注意
投与経路:外用にのみ使用し、内服しないこと。
使用時:1)眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
2)粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。
3)深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。
4)同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を伴う急性の皮膚炎を起こすことがあるので注意すること。
5)口腔内に使用するときは、患部を乾燥させて塗布すること。

【取扱い上の注意】

配合変化 マーキュロクロム液とは沈澱を生じる。

〈調剤包装単位用コマーシヤル〉



(01)04987020014544

GS1



(01)14987020014046



キャップ:PP

ガラス:ボトル