



500mL  
**イソプロパノール**「コザカイ・M」

日本薬局方 イソプロパノール  
 (イソプロピルアルコール)  
 Isopropanol



**外皮用殺菌消毒剤** 日本標準商品分類番号 872615  
 承認番号 16000AMZ04466000  
 製造販売業者の住所変更に伴う改訂  
 \*2007年10月第4版改訂  
 薬価収載 1967.10  
 販売開始 1967.10  
 再評価結果公表 1983.4  
 <貯法> 保存条件 火気を避けて保存する。  
 容 器 気密容器

**【禁忌】**(次の部位には使用しないこと。) 損傷皮膚及び粘膜 (刺激作用を有するので)

- \*【組成・性状】 本品1mL中に、日局 イソプロパノール1mLを含有する。本品は無色透明の液で、特異なおいがある。本品は水、メタノール、エタノール(95)又はジエチルエーテルと混和する。本品は燃えやすく、揮発性である。
- \*【効能・効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。

【用法・用量】 通常イソプロパノールとして、50～70%液を用いる。

【使用上の注意】

(1) 副作用(本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)

|                  |      |
|------------------|------|
| 種類\頻度            | 頻度不明 |
| 過敏症 <sup>注</sup> | 発疹等  |
| 皮 膚 <sup>注</sup> | 刺激症状 |

注)このような症状があらわれた場合は  
 使用を中止すること。

- (2) 臨床検査値への影響  
 注射部位に発赤を起すことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。
- (3) 適用上の注意
  - 1) 人 体  
 ア、外用にのみ使用すること。  
 イ、眼に入らないように注意すること。入った場合には水で良く洗い流すこと。  
 ウ、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。  
 エ、同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
  - 2) その他  
 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。

火気厳禁 アルコール類、危険等級II、水溶性

使用期限:

\*製造販売元

製造番号:

**小塚製薬株式会社**  
 \*\*東京都墨田区両国4-36-9