

日本薬局方

亜鉛華軟膏

Zinc Oxide Ointment

500g
收れん保護剤

販売

岩城製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町4-8-2

使用期限

製造番号

※製造販売

小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

※2012年4月
製造販売業者の住所変更に伴う改訂(第2版)
2010年11月作成(第1版)
<貯法>
容 器 気密容器
<販売名>
亜鉛華軟膏「コザカイ・M」

日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16000AMZ04489000
薬価収載	1950年10月
販売開始	2010年11月
再評価結果	1979年2月

【禁忌】(次の部位には使用しないこと。)

重度又は広範囲の熱傷

[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

【組成・性状】

組成 本品1,000g中に、日本薬局方 酸化亜鉛200gを含有する。
添加物として白色ワセリン、サラシミツロウ、流動パラフィン、ソルビタンセスキオレイン酸エステルを含有する。

性状 本品は白色である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の收れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門瘙痒症、白癬、面皰、癧、よう
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1.副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類＼頻度	頻度不明
過敏症 ^(注)	過敏症状
皮膚 ^(注)	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合は使用を中止すること。

2.適用上の注意

眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

局所の收れん、分泌物の減少、痂皮を軟化し、上皮の形成などの作用を有する。

〈調剤包装単位用コード〉



(01)04987020014582

GS1

(01)14987020014107



キャップ:PP
容 器:PP
外装フィルム:PVC