



飲用不可

消毒用ミツマルアルコール

折りたたんで
廃棄しやすい
ボトルを採用




溝のある方をつぶす。



溝にそってたたむと
きちんとためて
空気も入りません。

つぶせるボトルなので
寒冷時には、へこみ等、
変形することがありますが
品質には変わりなく
お使いいただけます。



*

* 2014年10月改訂(第8版)

日本標準商品分類番号
872619

外用殺菌消毒剤

消毒用

ミツマルアルコール

貯法：
気密容器に入れ、
火気を避けて保存。

承認番号	13400KUZ04831000
薬価収載	1984年 6月
販売開始	1959年 7月
再評価結果	1983年 4月

第4類・アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁

製造販売元

三ヶ三化学株式会社

仙台市青葉区芋沢字大竹新田 8-1
お客様相談室 TEL(022)394-3031

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜[損傷皮膚及び粘膜
への使用により、刺激作用を有する]

【組成・性状】

1. 組成

本剤100g中にメタノール変性アルコール54g、
イソプロパノール18g及び添加物として青色
1号を含有する。

2. 性状

本剤は青色澄明の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちに水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
[エタノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症(注)	発疹等
皮膚(注)	刺激症状

(注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

(1) 投与経路：外用にのみ使用すること。

(2) 使用時：

- 1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 2) 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- 3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 4) 本剤は、引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。また、電気メスを使用する場合は、乾燥させてから使用すること。

【薬効薬理】

本剤は、使用濃度において、栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

本剤は紫外線により退色することがあるので注意すること。

製造番号

使用期限

キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PP

500mL