

** 2018年 2月 改訂 (第4版)

* 2014年 11月 改訂

健胃消化剤

日本薬局方

センブリ・重曹散

Swertia and Sodium Bicarbonate Powder

センブリ・重曹散「東海」

日本標準商品分類番号

872333

承認番号 (61AM)1868

薬価収載 1967年7月

販売開始 1967年7月

再評価課 1990年3月

貯法：密閉容器

使用期限：3年 (表示の使用期限を参照すること)

**【禁忌 (次の患者には投与しないこと)】

- (1) ナトリウム摂取制限を必要とする患者
(高ナトリウム血症、浮腫、妊娠高血圧症候群等)
[ナトリウムの貯留増加により、症状が悪化するおそれがある。]
- (2) ヘキサミンを投与中の患者 (「相互作用」の項参照)

** 2. 相互作用

(1) 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ヘキサミン (ヘキサミン 静注液)	本剤はヘキサミンの効果を減弱させることがある。	ヘキサミンは酸性尿中でホルムアルデヒドとなり抗菌作用を発現するが、本剤は尿のpHを上昇させヘキサミンの効果を減弱させる。

(2) 併用注意 (併用に注意すること)

本剤は制酸作用等を有しているため、他の薬剤の吸収・排泄にも影響を与えることがある。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているため減量するなど注意すること。

*【組成・性状】

1. 組成

本品は100g中 センブリ末 3g、炭酸水素ナトリウム 70gを含む。添加物としてバレイショデンプンを含む。

2. 性状

本品は淡灰黄色で、味は苦い。

【効能・効果】

下記消化器症状の改善

食欲不振、胃部不快感、胃もたれ、嘔気・嘔吐

【用法・用量】

通常、成人1回0.5g～1.0g、1日3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 重篤な消化管潰瘍のある患者
[炭酸水素ナトリウムを配合しているため、症状が悪化するおそれがある。]
- (2) 腎障害のある患者
[ナトリウム貯留による浮腫があらわれるおそれがある。]
- (3) 心不全、高血圧症の患者
[ナトリウム過剰により、これらの症状が悪化するおそれがある。]
- (4) 肺機能障害のある患者
[呼吸性アルカローシスになるおそれがある。]
- (5) 低クロル性アルカローシス等の電解質失調の患者
[症状が悪化するおそれがある。]

*【有効成分に関する理化学的知見】

1. センブリ末

性状：灰黄緑色～黄褐色を呈し、わずかににおいがあり、味は極めて苦く、残留性である。

2. 炭酸水素ナトリウム

一般名：炭酸水素ナトリウム (Sodium Bicarbonate)

分子式：NaHCO₃

分子量：84.01

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、特異な塩味がある。

水にやや溶けやすく、エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。湿った空気中で徐々に分解する。

*【包装】 500g

*【主要文献】

日本薬局方解説書 (廣川書店)

*【文献請求先】

〒454-0954

名古屋市 中川区 江松一丁目 105

東海製薬株式会社 情報室

TEL 052-302-8501

* 製造販売元 **東海製薬株式会社**

名古屋市 中川区 江松一丁目 105