

鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

亜鉛華軟膏「東豊」

日本薬局方 亜鉛華軟膏

Zinc Oxide Ointment

開封日 年 月 日

500 g

製造販売元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩4-15-3

※2015年6月改訂(第6版)
(組成の記載方法変更)
2008年7月改訂(第5版)
(局方名、販売名併記)

【貯法】 気密容器、室温保存
【使用期限】 製造の翌月から3年

【禁忌】 (次の部位には使用しないこと。)
重度又は広範囲の熱傷 [症状を増悪させる。]

【組成・性状】

※組成: 1g中 酸化亜鉛 200mg
添加物として白色ワセリン、サラシミツロウ、流動パラフィン、
ソルビタンセスキオレイン酸エステル、BHT、トコフェロール
を含有する。
性状: 本剤は白色である。

【効能又は効果】

下記皮膚疾患の取れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門痒痒症、
白癬、面皰、癬、よう
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法及び用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

日本標準商品分類番号 872649

承認番号	16000AMZ05458
薬価収載	2008年7月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1979年2月

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

眼には使用しないこと。

製造番号

使用期限

