

皮膚軟化剤

イオウ・カンフルローション 「東豊」

Sulfur and Camphor Lotion 「TOHO」

日本薬局方

イオウ・カンフルローション

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩4-15-3

500mL

500mL

イオウ・カンフルローション「東豊」

2020年6月改訂(第3版)

2015年4月改訂

日本標準商品分類番号 872669

承認番号 16000AMZ05459

葉価収載 2008年7月

販売開始 1991年4月

再評価結果 1983年4月

貯法 : (1) 気密容器
(2) 開封後は冷所に保管すること。

使用期限 : 製造の翌月から3年

注意 : 取扱い上の注意の項参照

●禁忌(次の患者には使用しないこと)

本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

●組成・性状

1.組成

1mL中

イオウ 60mg, dl-カンフル 5mg

添加物としてヒドロキシプロビルセルロース、水酸化カルシウム、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル及びエタノールを含む。

2.性状

淡黄色の懸濁液で、放置するとき、成分の一部を分離する。

●効能・効果

瘻瘍、酒皶

●用法・用量

1日2回患部に塗布する。朝は上清液、晩は混濁液を用いる。



キャップ: PP
ボトル: PE

<調剤包装単位用コード>

(01)04987211206321

<販売包装単位用コード>

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^注	発赤、発疹等
皮膚	皮膚炎

注)このような症状があらわれた場合には
使用を中止すること。

2.適用上の注意

眼又は眼の周囲には使用しないこと。

●取扱い上の注意

- 本剤を小分けするときは容器をよく洗い、本剤をよく振り混ぜて、成分が均等になるように小分けすること。
- 使用時他の薬剤、化粧品が混入しないようにすること。
- 空気中の炭酸ガスを吸収して炭酸カルシウムの浮遊物が見られることがある。

製造番号

使用期限