

貯 法：室温保存

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

注 意：＜配合変化＞ マーキュロクロム液とは沈殿を生じる。

承認番号	16100AMZ01321
薬価収載	1979年1月
販売開始	2010年11月
再評価結果	1983年4月

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

希ヨードチンキ

希ヨードチンキ「ニココー」

DILUTE IODINE TINCTURE

【禁 忌】（次の患者には使用しないこと）

ヨード過敏症の患者

【組成・性状】

1. 組 成

本品100mL中 ヨウ素3g
及び添加物としてヨウ化カリウム、エタノール 含有。

2. 性 状

本品は暗赤褐色の液で、特異なおいがある。

比重 d_{20}^{20} : 約 0.93

【効能・効果】

皮膚表面の一般消毒

創傷・潰瘍の殺菌・消毒

歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒

【用法・用量】

本剤をそのまま又は2～5倍に希釈し、1日2～3回患部
及び皮膚に適量塗布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
調査を実施していない。

	頻度不明	0.1%未満
過敏症 ^{注)}		ヨード疹等
皮 膚 ^{注)}	刺激症状	

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 臨床検査結果に及ぼす影響

血漿たん白結合ヨード(PBI)及び甲状腺放射性ヨード
摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。

3. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用し、内服しないこと。

使用時：

(1) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には
水でよく洗い流すこと。

(2) 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に
使用しないこと。

(3) 深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用水
か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いない
こと。

(4) 同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を
伴う急性の皮膚炎を起こすことがあるので注意す
ること。

(5) 口腔内に使用するときは、患部を乾燥させて塗布
すること。

(6) 本剤は引火性、爆発性があるため、火気には十分
注意すること。

【包 装】

500mL

※【製品に関するお問い合わせ先】

ヴィアトリス製薬株式会社

メディカルインフォメーション部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

フリーダイヤル 0120-419-043

※販売元

ヴィアトリス製薬株式会社

東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593