

収斂・消炎・保護剤

日本薬局方 亜鉛華軟膏

亜鉛華軟膏「ニッコー」

ZINC OXIDE OINTMENT「NIKKO」

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

重度又は広範囲の熱傷には使用しないこと。[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	100g中 日局酸化亜鉛 20g
添加剤	流動パラフィン、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン

3.2 製剤の性状

性状	本品は白色である。
----	-----------

4. 効能又は効果

○下記皮膚疾患の収斂・消炎・保護・緩和な防腐

外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、面皰、せつ、よう

○その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

6. 用法及び用量

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	過敏症状
皮膚	発疹、刺激感等

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

眼には使用しないこと。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

局所の収斂、分泌物の減少などの作用を有する。酸化亜鉛の作用に加え、皮膚軟化性及び皮膚密着性を持ち、痂皮を軟化し、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患を改善する¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：酸化亜鉛（Zinc Oxide）

分子式：ZnO

分子量：81.38

性状：本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品は水、エタノール（95）、酢酸（100）又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空气中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

22. 包装

500g（ポリエチレン容器）

23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書 C-30-C-32, 廣川書店, 2021

24. 文献請求先及び問い合わせ先


日興製薬株式会社 信頼性保証部

〒501-6312 岐阜県羽島市上中町一色 467-1

電話 (058) 398-2576

26. 製造販売業者

26.1 製造販売元

 日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593