

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 20300AMZ00088000

販売開始 1960年5月

鎮咳去痰剤

キキョウ流エキス・シャゼンソウエキス・シャクヤクエキス配合液

オピセゾール®A液**OPISEZOL® A Solution****3. 組成・性状****3.1 組成**

販売名	オピセゾールA液
有効成分	1mL中 キキョウ流エキス 130mg シャゼンソウエキス 32mg シャクヤクエキス 12mg
添加剤	カンゾウエキス、水アメ、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、安息香酸ナトリウム、エタノール、カラメル、赤色2号、pH調節剤

3.2 製剤の性状

販売名	オピセゾールA液
剤形・性状	内用液剤 濃い赤褐色の液で、特異な芳香があり、味は甘い。
pH	3.5～4.5

4. 効能又は効果

次の疾患に伴う咳嗽及び喀痰喀出困難：

上気道炎、急性気管支炎

6. 用法及び用量

通常成人1日5～10mLを3回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意**9.5 妊婦**

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満
消化器	悪心

14. 適用上の注意**14.1 薬剤交付時の注意**

沈殿を生じることがあるので、よく振盪してから使用するよう指導すること。

17. 臨床成績**17.1 有効性及び安全性に関する試験****17.1.1 国内一般臨床試験**上気道炎及び急性気管支炎の患者136症例に、1回3mL又は1回1.5g（散）を1日3回1週間前後経口投与した一般臨床試験において、咳発作、痰等の臨床改善効果は、有効率（有効以上）74.3%の改善を示した¹⁾。**22. 包装**

500mL [ガラス瓶]

23. 主要文献

1) 社内資料：一般臨床試験

24. 文献請求先及び問い合わせ先日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
TEL (0120) 517-215
FAX (076) 442-8948**26. 製造販売業者等****26.1 製造販売元****日医工株式会社**

富山市総曲輪1丁目6番21