

貯 法：(1) 吸湿注意
(2) 室温保存

使用期限：3年（ケースに表示の使用期限を参照すること。）

許可番号	27A2X00107
薬価収載	2008年5月
販売開始	2008年5月
再評価結果	1981年8月

下剤

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」

日本薬局方 カルメロースナトリウム

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- (1) 急性腹症が疑われる患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
- (2) 重症の硬結便のある患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕

【組成・性状】

1. 組成

本品1g中 日局カルメロースナトリウム1g 含有。

2. 性状

白色～帯黄白色の粉末又は粒で、味はない。
メタノール、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。
水又は温湯を加えるとき、粘稠性のある液となる。
吸湿性である。

【効能・効果】

便秘症

【用法・用量】

カルメロースナトリウムとして、通常成人1日1.5～6gを、多量の水とともに、3回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

消化器：悪心・嘔吐、腹部膨満感等(0.1～5%未満)があらわれることがある。

2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦または妊娠している可能性のある婦人には、大量投与を避けること。〔子宮収縮を誘発して流早産の危険性がある。〕

3. 小児等への投与

小児に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）。

【薬効薬理】

腸管内で水分を吸収して膨張し、ゼラチン様の塊となって腸管壁を物理的に刺激する。この作用により大腸の蠕動運動を促進して排便を促す。^{1)～3)}

【包 装】

500g

【主要文献】

- 1) 羽野 壽他：新しい薬理学，第2版，268（1983）
- 2) 五味保男：日本臨床，39春増刊号，248（1981）
- 3) 三崎文夫他：日本薬剤師会雑誌，37(1)，19（1985）

【文献請求先】

丸石製薬株式会社 学術情報部
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

製造販売元

Ⓢ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2