

貯 法	保存条件 火気を避け、室温保存
容 器	気密容器
使用期限	容器底部に記載
注 意	火気厳禁 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性

承認番号	30200AMX00571000
薬価収載	2020年12月
販売開始	2020年12月

外用殺菌消毒剤

イソプロパノール消毒液70% 「ヤクハン」

70%イソプロパノール液

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）
 損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有するので]

【組成・性状】

- 組成
本品はイソプロパノール（C₃H₈O）67.4～72.6vol%を含む。
- 製剤の性状
本品は無色澄明の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	手指・皮膚の消毒 医療機器の消毒
用法・用量	通常イソプロパノールとして、50～70vol%液を用いる。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
 - 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]
- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮 膚 ^{注)}	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

- 臨床検査結果に及ぼす影響
注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。
- 適用上の注意
 - 投与経路
外用にのみ使用すること。
 - 使用時
 - 同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。
 - 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーター等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
 - 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するために0.2～1%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
 - 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

【包 装】

500mL（ジャバラ・減容）、5L、10L、18L

【文献請求先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
 〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
 フリーダイヤル (0120)517-215
 Fax (076)442-8948

販売元
 日医工株式会社
 NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社
 北海道北広島市北の里27番地