

\*\* 2011年 8月改訂(第2版 指定医薬品の削除)  
\* 1999年 12月改訂(新様式第1版)

日本標準商品分類番号 872644

承認番号 15200AMZ00730000  
薬価収載 1977年 8月  
販売開始 1977年 8月  
再評価結果 1979年 2月

貯法等 保存条件：室温保存  
容 器：気密容器  
「取扱い上の注意」参照

## 外用局所収れん剤

劇薬

# 山善酢酸鉛

(鉛 糖)

### 【組成・性状】

組成：本品 1g 中、酢酸鉛 ( $C_4H_6O_4Pb \cdot 3H_2O$ ) 1g を含有する。  
性状：光沢のある無色の結晶又は白色の結晶の塊で、わずかに酢酸のにおいがある。

### 【効能・効果】

表皮に欠損のない打撲

### 【用法・用量】

通常、1～2%の水溶液を湿布剤として使用する。

### 【使用上の注意】

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない(再審査対象外)。

#### 1. 副作用

- (1) 過敏症(頻度不明)：過敏症状があらわれた場合には使用を中止すること。
- (2) 長期・大量使用(頻度不明)：大量に吸収された場合には、鉛中毒を起こすことが報告されているので、長期・大量使用は避けること。

### \*【薬効薬理】

本品はタンパク質と結合して、タンパク鉛を生成し、収れん作用を現す。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：酢酸鉛 (Lead Acetate)  
分子式： $C_4H_6O_4Pb \cdot 3H_2O$   
分子量：379.33  
性 状：光沢のある無色の結晶又は白色の結晶の塊で、わずかに酢酸のにおいがある。

### \*【取扱い上の注意】


- (1) 本品は空気中で風解しやすく、炭酸ガスを吸収して水に澄明に溶けなくなるので、使用前後、速やかに密栓する等、取り扱いに注意すること。
- (2) 本品は水溶液中で、塩素イオン、炭酸イオンと反応して白濁を生じる。とくに本品の水溶液を調製する場合は煮沸するなどして二酸化炭素を除いた精製水を使用して用時調製すること。

【包 装】 5 0 0 g

【主要文献】 日本薬局方解説書

【文献請求先】 山善製薬株式会社 学術室 TEL06-6231-1821 FAX06-6231-1824  
〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番4号

製造販売元

 **山善製薬株式会社**  
大阪市中央区道修町2丁目2番4号

