

## 経皮鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg「ユートク」  
ジクロフェナクナトリウムテープ 30mg「ユートク」DICLOFENAC SODIUM TAPE  
ジクロフェナクナトリウムテープ

承認番号	15 mg : 21900AMX00411000 30 mg : 21900AMX00415000
薬価収載	2007年7月
販売開始	2007年7月

◆貯 法：室温保存（遮光した気密容器）

◆使用期限：2年（外箱，内袋に表示）

## 【禁忌（次の患者には使用しないこと）】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等により誘発される喘息発作）又はその既往歴のある患者〔重症喘息発作を誘発するおそれがある。〕

## 【組成・性状】

販売名	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」
成分・含量	1枚7cm×10cm（膏体0.75g/70cm <sup>2</sup> ）中：日本薬局方ジクロフェナクナトリウム15mg含有	1枚10cm×14cm（膏体1.5g/140cm <sup>2</sup> ）中：日本薬局方ジクロフェナクナトリウム30mg含有
添加物	L-メントール，スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体，ポリブテン，脂環族飽和炭化水素樹脂，流動パラフィン，その他1成分	
性状	支持体，ライナー及び白色半透明の膏体よりなる貼付剤で，わずかに芳香がある。	
大きさ	70 cm <sup>2</sup> (7 cm×10 cm)	140 cm <sup>2</sup> (10 cm×14 cm)
識別コード	YP-DFT15	YP-DFT30

## 【効能・効果】

下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎

変形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周囲炎，  
上腕骨上顆炎（テニス肘等），筋肉痛（筋・筋膜性腰痛症等），  
外傷後の腫脹・疼痛

## 【用法・用量】

1日1回患部に貼付する。

## 【使用上の注意】

## 1. 慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息のある患者〔気管支喘息患者の中にはアスピリン喘息患者も含まれており，それらの患者では重症喘息発作を誘発するおそれがある。〕

## 2. 重要な基本的注意

- (1) 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。
- (2) 皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので，感染を伴う炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し，観察を十分行い慎重に使用すること。
- (3) 慢性疾患（変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合には，薬物療法以外の療法も考慮すること。また，患者の状態を十分観察し，副作用の発現に留意すること。

## 3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ニューキノロン系抗菌剤 エノキサシン等	けいれんを起こすおそれがある。けいれんが発現した場合には，気道を確認し，ジアゼパムの静注等を行う。	ニューキノロン系抗菌剤が脳内の抑制性神経伝達物質であるGABAの受容体結合を濃度依存的に阻害し，ある種の非ステロイド性抗炎症剤との共存下ではその阻害作用が増強されることが動物で報告されている。

## 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

## (1) 重大な副作用（頻度不明）

- 1) ショック，アナフィラキシー：ショック，アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫，呼吸困難等）があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には使用を中止し，適切な処置を行うこと。
- 2) 接触皮膚炎：本剤使用部位に発赤，紅斑，発疹，そう痒感，疼痛の皮膚症状があらわれ，腫脹，浮腫，水疱・びらん等に悪化し，さらに全身に拡大し重篤化することがあるので，異常が認められた場合には直ちに使用を中止し，適切な処置を行うこと。

## (2) その他の副作用

頻度	頻度不明
皮膚 <sup>注)</sup>	皮膚炎，そう痒感，発赤，皮膚のあれ，刺激感，水疱，色素沈着，光線過敏症，浮腫，腫脹，皮膚剥脱

注) このような症状があらわれた場合には，使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

## ※※5. 妊婦，産婦，授乳婦等への使用

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。〔妊婦に対する安全性は確立していない。〕シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤，坐剤）を妊婦に使用し，胎児の腎機能障害及び尿量減少，それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。
- (2) 他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し，胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。

## 6. 小児等への使用

小児等に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

## 7. 適用上の注意

### 使用部位

- (1) 損傷皮膚及び粘膜に使用しないこと。
- (2) 湿疹又は発疹の部位に使用しないこと。

## 【薬物動態】

### 生物学的同等性試験<sup>1)</sup>

ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」及び標準製剤（貼付剤，15mg）について，健康成人男子の背部皮膚に貼付したときのジクロフェナクナトリウムの皮膚への移行量を，貼付後の製剤中に残存するジクロフェナクナトリウム量より算出した。得られた値について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果， $\log(0.8) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり，両製剤の生物学的同等性が確認された。

## 【臨床成績】

### 1. 臨床効果<sup>2)</sup>

ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」の一般臨床試験の概要は以下のとおりである（有効性解析対象例46例）。

疾患名	使用量 (1日量)	使用期間	改善率% (中等度改善以上)
変形性膝関節症	1枚×1回	2週間	81.5% (22例/27例)
打撲，捻挫，挫傷		1週間	100% (19例/19例)

### 2. 副作用及び臨床検査値の変動<sup>2)</sup>

全症例50例中，報告された副作用は3例（6.0%）であり，その症状は接触皮膚炎1件，発赤2件であった。臨床検査は30例で実施されたが，本剤に起因すると考えられる異常変動は認められなかった。

## 【薬効薬理】

### 1. 抗炎症作用<sup>3)</sup>

ラットのカラゲニン足浮腫抑制試験において無処置群及び基剤群に対して有意な抗炎症作用を示した。

### 2. 鎮痛作用<sup>4)</sup>

ラットのイースト炎症足疼痛試験において無処置群及び基剤群に対して有意な鎮痛作用を示した。

## 【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：ジクロフェナクナトリウム（Diclofenac Sodium）

化学名：Monosodium 2-(2,6-dichlorophenylamino)phenylacetate

分子式： $C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$

分子量：318.13

構造式：



性状：白色～微黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。

メタノール又はエタノール(95)に溶けやすく，水又は酢酸(100)にやや溶けにくく，ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

吸湿性である。

## 【取扱い上の注意】

### 安定性試験<sup>5)</sup>

各製剤について長期保存試験（25℃，相対湿度60%，24ヵ月）を行った結果，外観及び含量等は規格の範囲内であり，通常の市場流通下において2年間安定であることが確認された。

## 【包装】

- ・ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」  
70枚（7枚/袋×10袋）  
700枚（7枚/袋×100袋）
- ・ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」  
70枚（7枚/袋×10袋）  
560枚（7枚/袋×80袋）

## 【主要文献】

- 1) 祐徳薬品工業株式会社 社内資料（生物学的同等性試験）
- 2) 祐徳薬品工業株式会社 社内資料（臨床試験）
- 3) 祐徳薬品工業株式会社 社内資料（薬効薬理試験）
- 4) 祐徳薬品工業株式会社 社内資料（薬効薬理試験）
- 5) 祐徳薬品工業株式会社 社内資料（安定性試験）

## 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

祐徳薬品工業株式会社 学術研修部  
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番32号 オーシャン博多ビル  
TEL. 092-271-7702  
FAX. 092-271-6405