



1本入り×50

1本入り×50

※2018年1月改訂(第5版)  
2015年1月改訂(第4版)

外用殺菌消毒剤

外用殺菌消毒剤

外用殺菌消毒剤 薬価基準未収載

# 消毒用エタノール綿棒「ヨシダ」

## 消毒用エタノール綿棒「ヨシダ」

## 消毒用エタノール綿棒「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿棒


76.9～81.4vol%エタノール含浸綿棒

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿棒

火気厳禁

1本入り×50

### 綿棒の取り出し方



綿棒をアルミの上から押さえていると切れません

1 切り口の矢印に沿ってアルミを切る

2 残ったアルミを切り口の矢印に沿って切る

3 綿棒をつまんで取り出す



製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951

貯法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存  
使用期限：箱に記載

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】  
損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

#### 【組成・性状】

##### 1. 組成

成分・含量	担体	含浸量
本溶液100mL中、 日局エタノール83mL	綿棒	綿棒1本あたり本溶液 2mL

##### 2. 性状

本剤に含浸している液は無色澄明な液で、特異なにおいがある。

#### 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

#### 【用法・用量】

本剤をそのまま消毒部位に塗布する

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- 本剤が眼に入らないように注意すること。  
入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- 広範囲又は長期間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。(エタノール蒸気に大量または繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。)

##### 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明	注)
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹等	あらわれた場合には使用を中止すること。
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激症状	

# 消毒用エタノール綿棒「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿棒

1本入り×50

日本標準商品分類番号  
872615

承認番号 21600AMZ00631000  
薬価収載 薬価基準未収載  
販売開始 2006年2月

火気厳禁

綿棒の取り出し方は裏面を参照してください

綿棒をアルミの上から押さえていると切れません



製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951

外用殺菌消毒剤

#### 3. 適用上の注意

- 投与経路:外用にのみ使用すること。
- 使用時
  - 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
  - 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
  - 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、注意すること。
  - 本剤は、引火性、爆発性があるため、火気に注意すること。また電気メスを使用する場合は、乾燥させてから使用すること。

#### 【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、真菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

#### 【取扱上の注意】

開封後は速やかに使用すること。

#### 【包装】

1本入り×50

#### 【文献請求先】

吉田製薬株式会社  
学術部  
〒164-0011  
東京都中野区中央  
5-1-10

TEL  
03-3381-2004

