

## 第2類医薬品

かぜ薬

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう保管してください。

# かぜがお錠S

かぜがお錠Sは、非ピリン系の解熱鎮痛成分を中心に7種の成分の配合により、発熱や悪寒、頭痛、せきなど、かぜの諸症状の緩和に効果をあらわすとともに、鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状にも効くすぐれたかぜ薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある)
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼小児(15才未満)。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)がでる、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効 能** かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

### 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

年 令	15才以上	7才以上～15才未満	5才以上～7才未満
1回量	2錠	1錠	1/2錠

### <用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)5才未満児には服用させないでください。

### 成分と作用 6錠中

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	450mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。
エテンザミド	750mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜの初期にみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状をやわらげます。
ノスカピン	32mg	せきの中枢に働いてせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
無水カフェイン	120mg	頭痛をやわらげます。
チアミンジスルフィド	15mg	消耗しがちなビタミンを補います。

添加物としてステアリン酸Mg、タルク、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、黄色4号(タートラジン)を含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)1錠を分割し服用した残りを服用する場合には2日以内に服用してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (5)外箱に表示してある配置期限内に服用してください。

本品についての問い合わせ先  
 池田薬品工業株式会社 お客様相談室  
 電話 (076) 472-3311 (大代表)  
 受付時間 平日 8:10～17:00