

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

# 新エスタックGL

第②類医薬品

総合かぜ薬 甘草エキス配合 咳・のどの痛み・鼻水に

- 新エスタックGLは、アセトアミノフェンやクロルフェニラミンマレイン酸塩に3種の鎮咳去痰成分を配合した、かぜの諸症状によく効く総合かぜ薬です。
- 5才のお子様から服用できます。
- 生薬・カンゾウ(甘草)エキスが、のどの痛みに効果を発揮します。

## △ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと ( 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

#### ① 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)

#### ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眼鏡等があらわれることがあります。)

#### ④ 服用前後は飲酒しないでください

#### ⑤ 長期連用しないでください



### 相談すること

#### ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人は。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (7)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、線内障



#### ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

関係部位	症 状
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壞死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気

④5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果** かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

**用法・用量** 次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	11才~14才	5才~10才	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	×服用しないこと

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分	アセトアミノフェン ..... 900mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 ..... 48mg dL-メチルエフェドリン塩酸塩 ..... 60mg キキョウエキス ..... 150mg (キキョウ600mgに相当) クロルフェニラミンマレイン酸塩 ..... 7.5mg カンゾウエキス ..... 187.5mg (カンゾウ750mgに相当) 無水カフェイン ..... 75mg アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム塩) ..... 300mg チアミン硝化物(ビタミンB <sub>1</sub> 硝酸塩) ..... 12mg
9錠(成人1日量)中	添加物 : カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、ビタミンB <sub>2</sub>

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先	お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）
---------	--



製造販売元  
**エスエス製薬株式会社**  
〒163-1488 東京都新宿区西新宿3-20-2

