

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

小児用ヒストミンかぜシロップD 第②類医薬品

- 小児用ヒストミンかぜシロップDは、発熱、せき、鼻水などのかぜの諸症状に効果のある成分に加え、苦しきせきやたんを緩和する3つの生薬(カンゾウ・キキョウ・ナンテンジツ)を配合した、コデインを含まない小児用かぜ薬です。
- 小さなお子様でも飲みやすい黒糖風味のシロップです。

⚠ 使用上の注意

○本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと

必ずお読みください。



🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)高齢者。
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)次の症状のある人。 高熱、むくみ、排尿困難
 - (7)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス-ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群*	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。*
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

□のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効 能

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

年 齢	1 回 量	服用回数
3才～6才	5mL	1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。また、必要な場合には就寝前に用いてもよく、やむをえない場合には約4時間の間隔において6回まで服用できます。（添付の目盛付コップではかり服用してください。）
3才未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)開栓時、手指にケガをしないようご注意ください。
- (4)本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈んで生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

成分・分量

30mL中

アセトアミノフェン300mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg、デキストロメトールファン臭化水素酸塩水和物16mg、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩10mg、グアイフェネシン45mg、無水カフェイン50mg、カンゾウエキス330mg（甘草1100mgに相当）、キキョウ流エキス0.3mL（キキョウ300mgに相当）、ナンテンジツ流エキス0.36mL（南天実360mgに相当）

添加物：白糖、スクラロース、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、アルコール、安息香酸Na、パラベン、香料、安息香酸ベンジル、メントール、エチルパニリン、グリセリン、パニリン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)添付の目盛付コップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地