

生薬抽出成分配合のかぜ薬

カイゲンかぜシロップ小児用S

第②類医薬品

特 徴

カイゲンかぜシロップ小児用Sは、非ピリン系のかぜ薬で、熱をさまし痛みを緩和する解熱鎮痛薬、くしゃみ・鼻水などアレルギー症状を緩和する抗ヒスタミン薬、せきをしずめたんの切れをよくする鎮咳去痰薬や去痰生薬（キキョウ、セネガ）の抽出エキスを加え、かぜの諸症状を緩和するのみやすいシロップ剤です。お子さまにやさしい（ノンカフェイン）です。

⚠ 使用上の注意**❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

* (6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、尿尿等があらわれる。

(裏面に続く)

無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
* 呼 吸 抑 制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（発熱、せき、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、のどの痛み、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内および必要な場合には就寝前に服用してください。また場合によっては約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用してもさすつかえありません。

年齢	3才以上 ～7才未満	1才以上 ～3才未満	6ヵ月以上 ～1才未満	3ヵ月以上 ～6ヵ月未満	3ヵ月未満
1回量	10mL	7mL	6mL	5mL	服用させないでください

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

* (3) 7才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

成分・分量

60mL中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	作用
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せき中枢に働いてせきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	かぜの初期にみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみのアレルギー症状をやわらげます。
キキョウ流エキス (キキョウとして1000mg)	1mL	共に生薬去痰成分で、これらに含まれる主成分のサポニンが、気管支を刺激して反射的に粘液の分泌を促し、粘稠なたんをうすめて流動をよくし、たんを出しやすくします。
セネガ流エキス (セネガとして300mg)	0.3mL	
○添加物としてパラベン、デヒドロ酢酸 Na、安息香酸 Na、クエン酸水和物、クエン酸 Na 水和物、白糖、高果糖液糖、カラメル、バニリン、エタノール、ブドウ糖果糖液糖、グリセリン、香料を含有します。		

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用後は、汚染を防ぐため、ピンのフタをよくしめてください。
- 本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかな濁りを生ずることもありますが、効果には変わりありませんので、よく振ってからご使用ください。
- 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。
 カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911
 受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）