



*2023年1月改訂(使用上の注意改訂)

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



総合かぜ薬

麻黄湯エキス・ビタミンB₁・B₂配合

ストナ[®]シロップA 小児用

- ストナシロップA小児用は、甘くてのみやすい、かっ色のシロップです。
- かぜのひき始めに、寒気がして、発熱、頭痛があり、身体のふしごしが痛い時に効果がある麻黄湯(まおうとう)エキスを配合しています。
- かぜの時に不足しがちなビタミンB₁・B₂を配合しています。

⚠ 使用上の注意

(☒) してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期運用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプスジョンソン症候群) 中毒性表皮壞死溶解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
* 薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
口のかわき、眼氣
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
- ※本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

[効能]

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
[用法・用量]

下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。場合により、1日6回まで服用できますが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。

年齢	3~6歳	1~2歳	6~11ヶ月	3~5ヶ月	3ヶ月未満
1回服用量	 10mL	 7.5mL	 6mL	 5mL	服用しないでください
1日服用回数		3 回			

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。(添付の計量カップをご使用ください。)
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

〔成分・分量と働き〕60mL中

成 分	分 量	働き
アセトアミノフェン	240mg	熱をさげ、痛みを抑えます。
ジフェニルピラリン塩酸塩	1.3mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりを抑えます。
クエン酸チベピジン	20mg	せき中枢に働き、せきを鎮めます。たんのきれをよくします。
グアイフェネシン	65mg	たんのきれをよくします。
ビタミンB ₁ :硝酸塩	8mg	かぜの時に不足しがちなビタミンを補います。
ビタミンB ₂ :リノ酸エステル	4mg	
麻黄湯エキス	130mg (マオウ 267mg、キョウニン 267mg ケイヒ 200mg、カンゾウ 133mg)	かぜの諸症状を緩和します。

添加物として、白糖、安息香酸Na、パラベン、アルコール、カラメル、塩化Ca、クエン酸、pH調節剤、香料(プロピレン glycole、バニリン、エチルバニリンを含む)を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

- (1) 本剤はビタミンB₂:リノ酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
(2) 本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
(4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
(5) 甘味成分のためキャップが開けにくくなることがありますが、このようなときは、一度キャップ部を温湯に浸してから開けてください。

◎早くよくなつていただくためのアドバイス

1. 睡眠をとり無理をしないことが治療の第一歩。特に熱がある時は、安静にしましょう。
2. 衣服や寝具は体をあたたかく保てるものを。もちろん部屋もあため、なるべく加湿して空気の乾燥を防ぎましょう。
3. 汗をかいたらタオルでふいて、下着をとりかえ、体を冷やしないようにしましょう。
4. 食事はあたたかいもの、水分やビタミンの多いもの、カロリーの高いもの、消化のよいものをとりましょう。

子供は、病気になっても自分の症状はわからないもの。そのような時、周りの人がほんの少しきをつけていたら、軽い症状のうちに治せるものです。お子さまがかぜかなと思ったら、早めに手当し、十分な休養をとらせましょう。

お子さまの誤飲を防ぐ、安全キャップを採用



■あけ方

- ①キャップを強く押しながら
②矢印の方向に回してあけます。

*テーブルの上に置いて上から押すと、力を入れやすくなります。

■しめ方

ボトルの口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかりとしめてください。