

のどの痛み・鼻みず・鼻づまり・発熱に

第2類医薬品

シオノギ総合かぜ薬  
パイロ<sup>®</sup>AM錠

シオノギ製薬

リゾチーム塩酸塩配合

かぜにかかると、のどの痛み、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、発熱、せきなどいろいろな症状をともなう場合も少なくありません。これらのかぜの諸症状に対してパイロAM錠は、抗炎症作用のあるリゾチーム塩酸塩を含む7種の成分を配合した総合かぜ薬です。これらの配合成分が働いて、かぜの諸症状の緩和に効果をあらわします。錠剤は小さくてのみやすく、しかも早くとけるよう工夫され、また、携帯にも便利な包装です。5才のお子様から成人までご家族で服用できます。



使用上の注意 ……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤、本剤の成分または鶏卵によりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい(眠気などがあらわれることがあります)

4. 服用前後は飲酒しないで下さい

5. 長期連用しないで下さい

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人  
(3) 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児(15才未満)  
(4) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(5) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人  
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	呼 吸 器	息切れ、息苦しさ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌 尿 器	排尿困難
精神神経系	めまい	そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。

(裏面につづく)

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい  
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

…… 効能・効果 ……

かぜの諸症状（鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

…… 用法・用量 ……

次の量を食後なるべく30分以内に、水またはぬるま湯でおのみ下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

…… 成分・分量 ……


パイロンAM錠は、白色の錠剤で、9錠（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成分	含量(9錠中)	はたらき
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5 mg	鼻みず、鼻づまり、くしゃみをおさえる
エテンザミド	900 mg	痛みをおさえ、熱を下げる
アセトアミノフェン	360 mg	
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	45 mg	せきをしずめる
クレゾールスルホン酸カリウム	250 mg	気道にくっついた粘稠なたんをうすめ、たんの切れをよくする
リゾチーム塩酸塩	60 mg (力価)	気道にくっついた粘稠なたんを分解し、たんの切れをよくする
無水カフェイン	150 mg	痛みをおさえるはたらきを助ける

添加物としてトウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、結晶セルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) シートから出して他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… かぜを早く治すために、次のことに心がけて下さい。 ……

<p>■ 安静</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無理な仕事や外出はさける。</li> <li>• 暖かくして十分な睡眠</li> </ul> 	<p>■ 保温</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 着衣、室温・湿度に注意</li> <li>• 熱のあるときは入浴はさける。</li> </ul> 	<p>■ 栄養・ビタミン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 温かくカロリーの高い、消化しやすい食事</li> <li>• ビタミンの補給は抵抗力を高め、かぜの回復を早めます。</li> </ul> 	<p>■ のどの保護</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 禁煙と室内の湿度を適度に。</li> <li>• 外出後は必ずうがい</li> </ul> 
---	---	--	---

…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®・登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3丁目1番8号