

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

かぜ薬

ソボンこどもかぜ薬細粒

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
(3)フェニルケトン尿症の人 (本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有しています)

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがあります)

4. 服用前後は飲酒しないで下さい

5. 過量服用・長期連用しないで下さい

👨👩👧👦【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人 (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)次の症状のある人：高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい 口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
7 才以上 11 才未満	1 包 	3 回
3 才以上 7 才未満	2/3 包 	
1 才以上 3 才未満	1/2 包 	
1 才未満	服用しないこと 	

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

【成分分量】

1 日量 (3包) 中

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	450mg	かぜによる発熱、のどの痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.75mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ等をおさえます。
チペピジンヒベンズ酸塩	30mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
リボフラビン(ビタミンB2)	3mg	傷ついた粘膜の修復を促すビタミンです。
カンゾウエキス末	36mg	炎症をしずめ、のどの痛みをやわらげます。


添加物としてアスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、D-マンニトール、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、香料、エチルバニリン、バニリンを含有します。

<成分分量に関連する注意>

配合成分のリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限内に服用して下さい。



- 本剤には、生薬から抽出した成分が含まれておりますので、商品により多少細粒の色調が異なることがありますが、効果にはわかりありません。

<かぜの養生法>

- 食事は栄養に富み消化がよく、あたたかいものを心がけましょう。
- 部屋を暖かくし、乾燥に気をつけ、時々部屋の空気を入れ換えましょう。
- 汗をかいたら着衣を早く着替え、からだがかえないようにしましょう。
- 無理をせず、安静にし、体力を消耗しないようにしましょう。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電 話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879