

販売名:新セビー液「小児用」

【使用上の注意】

第2類医薬品

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本人又は家族の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
 - ① 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮痙去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(処方箋用内服薬、単剤酔い薬、アレルギー自家薬)
3. 服用中、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(血気等があらわれることがある)
4. 授乳中の方は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 服用前後は飲酒しないこと
6. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
 - ・高熱、むくみ、排尿困難
 - ・四肢の痙攣を受けた人、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃、十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用作用が考えられるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	温度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、赤いかゆみ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発赤、発疹、赤くなった皮膚上、小さなブツブツ(小疱)が出る、全身がだるい、発赤が強い痒が持続したり、意識に悪化する。
中毒性表皮剥離症	高熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

症状の名称	症状
発熱	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のたれさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	喉が赤くなったかきし声や痰、喉乾くなる、空きき、発熱等がみられ、これが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロンの過剰	手足のたれさ、しびれ、こむら返り、腰痛、めまい、頭痛、脱力、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	喉をさるとき「ゼーゼーヒューヒュー」となる。息苦しき等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなることとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しき等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が認められた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ・便秘、目のかわき、眼赤
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分】1日量(30mL)中
 アセトアミノフェン 300mg、ジブプロロケンリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 15mg、グアヤコールスホン酸カリウム 50mg、d-クロルフェニリンマレイン酸塩 1.1mg、ビタミンB1リン酸エステル 1.2mg、安原香酸ナトリウムカプセル 75mg、カンゾウ乾燥エキス 333mg(カンゾウ 1665mgに相当)、ショウキョウ漢工キス 500μL(ショウキョウ 500mgに相当)

添加物:ブチルパラベン、ポリソルブ、クエン酸、クエン酸Na、白糖、香料、エタノール、プロピレングリコール、パロリン、エチルパラソリン、pH調節剤2成分、その他1成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 小児の容器に入れないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 本剤は生薬製剤のため、まれに混濁することがあるが製効には変わりない。よく振ってから服用すること。
- (5) 服用のつど、瓶の口をよく拭いてからフタをぬぐこと。
- (6) 添付の計量カップは、ご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管すること。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

総合感冒薬

新セビー液

「小児用」

30mL

CEP/IE

くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、発熱、せき、などの緩和

【効能・効果】
 かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】
 1日の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用する。なお、1日6回まで服用できるが、その場合は約4時間の間隔をおいて服用すること。(添付計量カップ使用)

年齢	1回量
3才以上7才未満	5mL
1才以上3才未満	3.75mL
6か月以上1才未満	3mL
3か月以上6か月未満	2.5mL
3か月未満	服用しないこと。

【用法・用量に関連する注意】
 (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
 (2) 7才未満の小児には、医師の診察を受けさせることを優先すること。
 (3) 用法・用量を厳守すること。

紙箱

計量カップ: PS

金属: キャップ
 ガラス: 瓶

定めるときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。

副作用報告致謝制度 ☎ 0120-149-931

セビーはセリア新薬工業(株)の登録商標です。

製造番号 A71

使用期限(年月) 2020.4

【製造販売元】 東京都中央区日本橋小舟町10-11
 セリア新薬工業株式会社
 お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
 受付 9:00~17:50(土・祝日を除く)

第2類医薬品 セリア新薬