

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

つらい風邪に効く  
胃を守る成分プラス

**ジキニン<sup>®</sup>First** 顆粒

一かぜ薬一

第2類医薬品

販売名：ジキニンファースト顆粒N

- つらい風邪の諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまりなど)を緩和します。
- 胃粘膜保護成分グリシンを配合しています。
- サッと溶けるクイックリリース製法を採用しました。



## 使用上の注意



してはいけません！



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

### 1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 12才未満の小児。

### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがある。)

### 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

### 5. 服用前後は飲酒しないでください。

### 6. 長期連用しないでください。



## 相談すること

### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症



### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |
| その他   | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                         | 症 状                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                            | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 薬剤性過敏症症候群                                                     | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。                                |

[裏面につづく]

〔表面からのつづき〕

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 腎障害             | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。                    |
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| ぜんそく            | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                  |
| 再生不良性貧血         | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。  |
| 無顆粒球症           | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                            |
| 呼吸抑制            | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。                                                   |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、頭痛、悪寒（発熱によるさむけ）、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢         | 1 回量                                                                                      | 1 日服用回数 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15才以上       | 1 包    | 3 回     |
| 12才以上 15才未満 | 2/3 包  |         |
| 12才未満       | 服用しないこと                                                                                   |         |

＜用法・用量に関連する注意＞

- （1）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
（2）本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

## 【成 分】（1包1.2g中）

| 成 分             | 分量（原生薬換算量）  | は た ら き             |
|-----------------|-------------|---------------------|
| アセトアミノフェン       | 300mg       | のどの痛み、発熱、さむけを緩和します。 |
| ジヒドロコデインリン酸塩    | 8mg         | せきを鎮めます。            |
| ノスカピン           | 16mg        |                     |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 20mg        | 気管支を拡張し、せきを鎮めます。    |
| カンゾウ（甘草）エキス粉末   | 96mg（751mg） | 炎症を抑え、せき、たんを緩和します。  |
| d-クロルフェニルマレイン酸塩 | 1.17mg      | 鼻水、鼻づまり、くしゃみを抑えます。  |
| 無水カフェイン         | 25mg        | 頭痛を緩和します。           |
| グリシン            | 60mg        | 胃への負担を緩和します。        |

添加物としてアスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、タルク、部分アルファー化デンプン、エリスリトール、ステビア抽出物、デキストリン、ポビドン、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
（2）小児の手のとどかない所に保管してください。  
（3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）  
（4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
（5）使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店  
2) 全薬お客様相談室  
電 話：03（4476）8030  
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元

**全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
<https://www.zenyaku.co.jp>