

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

小児用かぜ内服薬 小児用 **ジキニン**[®] シロップD

第2類医薬品

販売名:小児用ジキニンシロップD

小児用ジキニンシロップDは、お子さまのかぜによる諸症状を緩和する内服液剤です。

【使用上の注意】



*本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 次の人は服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがある。)
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 過量服用・長期連用しないでください。

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

【表面からのつづき】

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かぜの諸症状（発熱、頭痛、せき、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

次の1回量を（添付の計量カップではかり）食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
3才以上 7才未満	5 mL	3回
6ヵ月以上 3才未満	3 mL	
3ヵ月以上 6ヵ月未満	2 mL	
3ヵ月未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

必要な場合には就寝前の服用も加えて1日6回まで服用できますが、このような場合には約4時間の間隔をおいてください。

【成 分】 (30mL中)

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………20 mg 無水カフェイン……………25 mg
 アセトアミノフェン……………300 mg カンゾウ(甘草)エキス……………332 mg (原生薬換算量1,660 mg)
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………2.5 mg
 添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、白糖を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
- 開栓後は、長期保存しないでください。

＝安全キャップについて＝

本品には、薬量を計る計量カップ(透明)と、お子さまの誤飲を防ぐための安全キャップ(茶色)とが、透明なフィルムに包まれて添付されています。ご服用に際しては、この安全キャップをご使用ください。(この安全キャップを取付けますと、お子さまにはキャップが簡単にあけられないようになります。)

ご使用の際には、透明のフィルムをはがし、安全キャップをとり出したのち、下記手順にしたがって取付けてください。

【取付け方】

安全キャップ(茶色)を容器の白いキャップの上にかぶせ、右図のようにパチンと音がするまで手のひらで上から強く押し、取付けます。この状態では、安全キャップはから回ります。

◎いったん安全キャップを取付けたら、取りはずさないでください。



【あけ方】

右図①のようにキャップを上から押しながら②の矢印の方向に回し、あけてください。

【しめ方】

普通のキャップをしめる要領で回し、から回し始めたら、右図①のようにキャップを上から押しながら③の矢印の方向に回し、しっかりしめてください。その後、上から押さずに②の矢印の方向に回し、から回りにしてキャップがあかないことを確かめてください。



問い合わせ先

- お買い求めのお店
- 全薬お客様相談室
電 話：03(4476)8030
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)