

2015年2月下線部改訂

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合感冒薬

# ハイゼンG

第②類医薬品

ハイゼンGは、アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩などの成分に加えて、4種類の和漢生薬を配合した、かぜによる不快な症状を緩和する効果を高めた総合感冒薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してせんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

### ▢ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人。(4)高齢者。(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)次の症状のある人。高熱、排尿困難(7)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、線内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

(裏面もお読みください。)

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用させないこと	

（用法・用量に関する注意）

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



### 成分・分量 6カプセル(成人1日量)中

成 分	分 量	は たら き
アセトアミノフェン	770mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状をやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき中枢にはたらいて、せきをしすめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしすめます。
無水カフェイン	75mg	熱や痛みをとる成分のはたらきを補助します。
ビスベンチアミン（ビタミンB <sub>1</sub> ） （謁導体）	10mg	かぜの際に不足しがちなビタミンB <sub>1</sub> を補給します。
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	6mg	発熱時に不足しがちなビタミンB <sub>2</sub> を補給します。
オウヒエキス	40mg 〔オウヒとして 666.8mg〕	せきをしすめ、たんを出しやすくなります。
ケイヒ末	150mg	熱を下げ、関節の痛みをやわらげます。
ゴオウ	3mg	かぜで弱ったからだの回復を助けます。
地竜エキス散	210mg 〔シリウとして 420mg〕	緩和な解熱効果と、せき止めの作用があります。

添加物としてパレイショデンブン、トウモロコシデンブン、乳糖、セルロース、硫酸Ca、タルク、カルメロースNa、カルメロースCa、カルボキシメチルstärkeNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸ポリオキシル、デヒドロ酢酸Na、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

### お問い合わせ先

くすり相談窓口 ☎(076)435-5055 午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

発売元 中部薬品株式会社 製造販売元 第一薬品工業株式会社  
富山県射水市戸破69-12 富山市草島15-1