

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

小柴胡湯エキス配合かぜ薬

ヘルビックS顆粒・ゴールド

第②類医薬品

ヘルビックS顆粒・ゴールドは、「かぜ」のときの鼻水、のどの痛み、せき、たん、発熱、頭痛などの症状にすぐれた効果をあらわす6種の成分と、昔から「かぜ」のときに用いられている小柴胡湯のエキス末を1包中330mg配合した、のみやすい顆粒の総合かぜ薬です。

△ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

(3)12才未満の小兒。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 服用前後は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(6)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

(7)インターフェロン製剤で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌 尿 器 | 排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |
| そ の 他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステイプス・ジンソン・グーリー) 中毒性表皮壞死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 薬剤性過敏症症候群 | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|-------------------------|
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■成分・分量

| 成 分 | 1包(1.6g) 中含量 | はたらき(作用) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| アセトアミノフェン | 300mg | 熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みなどをやわらげます。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 1.17mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。 |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 8mg | せきをしずめます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 20mg | 気管支をひろげ、せきをしずめます。 |
| グアイフエネシン | 83.3mg | たんをきれやすくします。 |
| 無水カフェイン | 25mg | 頭痛をやわらげます。 |
| 小柴胡湯エキス末 | 330mg (小柴胡湯3.99gに相当) | かぜに伴う熱感、悪寒、頭痛などの症状に効果があります。 |

●添加物として、D-マンニトール、サッカリンNa、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、メタケイ酸アルミニウムMg、無水ケイ酸を含有します。

■効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

■用法・用量

次の1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢 | 15才以上 | 12才以上15才未満 | 12才未満 |
|-----|-------|------------|---------|
| 1回量 | 1包 | 2/3包 | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 定められた用法・用量を厳守してください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈製品情報問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

〈副作用被害救済制度の問い合わせ先〉

(独) 医薬品医療機器総合機構

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)