

総合感冒薬

第②類医薬品

アスゲン[®]新感冒錠

アスゲン新感冒錠は、「かぜ」の諸症状である発熱、頭痛、関節の痛み、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、悪寒などに効果をあらわすよう配合された非ピリン系の総合感冒薬です。特に、和漢薬のマオウとカンゾウより抽出されたエキスにケイヒ末が配合され、アセトアミノフェンとともに、発汗・解熱・鎮痛・鎮咳作用によって「かぜ」の症状を改善します。

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
 - 本剤又は、他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがある。）
- 服用時は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や眼の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

相談すること (おもてより続く)

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口の渴き

【効能・効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

【用法・用量】

下記1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	7才以上15才未満	5才以上7才未満	5才未満
1回量	4錠	2錠	1錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 5才以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえないよう、よく注意してください。
- 錠剤の取り出し方(PTP品)
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】

淡黄赤色の錠剤で、12錠(成人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成 分	分 量
マオウエキス(原生薬として3.0gに相当)	660 mg
カンゾウエキス(原生薬として1.2gに相当)	340 mg
ニンジンエキス(原生薬として0.9gに相当)	350 mg
ケイヒ末	600 mg
アセトアミノフェン	900 mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5 mg
無水カフェイン	104 mg

添加物として、リン酸水素カルシウム、酸化マグネシウム、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、酸化チタン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、カルナウパロウ、黄色5号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- ピンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。(ピン入品)
- ピンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。(ピン入品)
- 使用期限(外箱に表示)をすぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

アスゲン製薬株式会社 医薬安全情報課
名古屋市東区泉二丁目28-8 電話:0120-935-758(フリーダイヤル)
受付時間 午前9:00~午後5:00(土日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 **アスゲン製薬株式会社**
名古屋市東区泉二丁目28-8