

*：2026年1月(使用上の注意改訂)

この説明文書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

和漢薬(牛黄・人参)配合 **かぜピラα** **第2類医薬品**

！ 使用上の注意

- してはいけないこと** **ⓧ**
- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. **次の人は服用しないでください**
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
 3. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(眠気等があらわれることがあります。)
 4. **服用前後は飲酒しないでください**
 5. **長期連用しないでください**
 - *6. **過量服用しないでください**

相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
(5)高齢者。
(6)薬などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、ぜんそく等)を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(8)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症	状	関係部位	症	状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ		呼吸器	息切れ、息苦しさ	
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振		泌尿器	排尿困難	
精神神経系	めまい		その他	過度の体温低下	

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症	状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。	
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。	
薬剤性過敏症 症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。	
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。	
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。	

(必ず裏面もお読みください)

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】
かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】
次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	1 包 (赤色丸剤6粒、黄色丸剤6粒)	3回
11歳以上15歳未満	2/3包 (赤色丸剤4粒、黄色丸剤4粒)	
7歳以上11歳未満	1/2包 (赤色丸剤3粒、黄色丸剤3粒)	
3歳以上 7 歳未満	1/3包 (赤色丸剤2粒、黄色丸剤2粒)	
3歳未満	服用しないでください。	

＜用法・用量に関連する注意＞
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成 分		分 量	はたらき
顆粒剤 (2.4g中)	アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、のどの痛みなどを抑えます。
	エテンザミド	500mg	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を抑えます。
	デキストロメトルフアン 臭化水素酸塩水和物	48mg	せきを鎮めます。
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支を拡げ、呼吸を楽にし、せきを鎮めます。
	無水カフェイン	150mg	頭痛を和らげます。
赤色丸剤 (18粒中)	ゴオウ	2 mg	熱を下げます。
	リボフラビン	2 mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。
黄色丸剤 (18粒中)	ニンジン末	150mg	
	ヘスベリジン	30mg	
黄色丸剤 (18粒中)	ニンジン末	150mg	

1包量 (1g) 中、顆粒0.8g、赤色丸剤6粒、黄色丸剤6粒
添加物：バレイショデンプン、乳糖、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸Ca、タルク、ヒプロメロース、赤色3号、黄色4号（タートラジン）

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室
〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
電話：076-478-5580 受付時間：9:00～16:00(土、日、祝日を除く)