

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

総合感冒薬

ヒルAシロップ「小児用」第②類医薬品

■販売名：ヒルAシロップ「小児用」
ヒルAシロップ「小児用」は服用しやすいうちに味と香りを工夫した黒褐色のシロップ剤で、解熱・鎮痛作用を持つアセトアミノフェンに、せき、鼻水・鼻づまりなどを抑える成分を効果的に配合した総合感冒薬で、かぜの諸症状を緩和してくれます。

⚠ 使用上の注意

- ❌ **してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1. **次の人は服用しないでください**
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
 3. **服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください**（眠気等があらわれることがあります。）
 4. **服用前後は飲酒しないでください**
 5. **長期連用しないでください**

📄 **相談すること**

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**
(1)医師または歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。(4)高齢者。(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人：高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のほれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

裏面もお読みください

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

■効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■用法・用量

※下記の量を添付の目盛付計量カップではかり、食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
3 才 以 上 7 才 未 満	5mL	3 回 食 後 ・ 必要な場合には就寝前 ・ 止むを得ない場合には約 4 時間の間隔を置いて 6 回まで
1 才 以 上 3 才 未 満	3.5mL	
6 ヶ 月 以 上 1 才 未 満	3mL	
3 ヶ 月 以 上 6 ヶ 月 未 満	2.5mL	
3 ヶ 月 未 満 の 乳 児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■成分・分量 1びん(30mL)中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、痛みを和らげる
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりをおさえる
デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	16mg	せきを鎮め、たんを切る
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	18mg	
無水カフェイン	30mg	頭痛を和らげる

※添加物としてカンゾウエキス、ケイヒチンキ、白糖、カラメル、エタノール、安息香酸ナトリウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。
- (5)使用後は、汚染を防ぐため、ビンのを拭いてからフタをよく閉めてください。
- (6)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。
- (7)計量カップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願い申し上げます。

合名会社 東宝製薬
電 話 058-251-6668（代表）
受付時間 10:00～16:00
（土、日、祝日を除く）

製造販売元

合名会社 東宝製薬
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地