

4-C コーカ

第②類医薬品

114-C-49

114-C-49
4-C
コーカ

かぜに コーカ



販売名：コーカカプセル 第②類医薬品

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

大人(15歳以上) 1回1カプセル
1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

注意

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してせんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
5. 直射日光の当たらない温めの少ない涼しい所に保管すること

かぜに コーカ



成型シート

配置期限

製造番号

2日分 6カプセル ￥750+税。

発 売 元 日研製薬株式会社

奈良県橿原市疋田30番地

製造販売元 宁薬化成工業株式会社


奈良県大和高田市旭南町2-26

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

AB4710130128

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい。
また必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

△ かぜ薬の使用上の注意




してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 服用前後は飲酒をしないでください
6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又是妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中のの人。
- (4)**水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小兒(15歳未満)。

- (5) 高齢者。
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

- (8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、
緑内障、*呼吸機能障害、*閉塞性睡眠時無呼吸症候群、*肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発 痒・発 赤、か ゆ み	泌 尿 器	排 尿 困 難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食 欲 不 振	そ の 他	過 度 の 体 温 低 下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。


症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、どののかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーエズボンノ症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、どの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小脳胞)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
中毒性表皮壞死溶解症 急性汎発性発疹性膚斑症	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
肝機能障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、どの痛み等があらわれる。
*呼吸抑制	息切れ、息苦さ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- *便秘、口のかわき、眠気
- 4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
 3. 他の容器に入れ替えないでください。
- (誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください



[お問い合わせ]

寧薬化学工業株式会社
相談窓口☎ 0745-22-4151
受付時間 9時~16時 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**
奈良県大和高田市旭南町2-25

*ジヒドロコデインリン酸塩を含有するもの

**エテンザミドを含有するもの