

年 月 日

製造販売元 華英化学工業株式会社 奈良県大和高田市旭南町2-25

開封日

第②類
医薬品

株式会社 田原兄弟社

6cap.

かぜ
ねっ
せき
いたみ



非ヒソ系

カゼに

第②類
医薬品

かぜにスターカプセル

prevention and care

品名 スターカプセル

第②類医薬品

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

成分及び分量

1日量(3カプセル)中
アセトアミノフェン……………840mg
無水カフェイン……………90mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 ……8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ……30mg
ノスカピン……………24mg
添加物としてカルメロースCa、パレイショ
デンプン、セルロース、カプセルに酸化
チタン、ラウリル硫酸Na、マクロゴール、
ゼラチン、赤色3号及び黄色5号を含有する。

用法及び用量

大人(15歳以上)……………1回1カプセル
1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

注意

1. 次の人は服用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起したことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起したことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

2日分 6カプセル ¥800円 + 税.



第②類医薬品
かぜにスターカプセル

あける

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

紙 : 箱
リサイクル : 成型シート

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい。
また必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

⚠ かぜ薬の使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. *授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 服用前後は飲酒をしないでください
6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) *水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、*呼吸機能障害、*閉塞性睡眠時無呼吸症候群、*肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。


症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブアジソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
*呼吸抑制	息切れ、息苦さ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- *便秘、口のかわき、眠気
- 4.5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
2. 小児の手の届かない所に保管してください
3. 他の容器に入れ替えないでください
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください



【お問い合わせ】

寧薬化学工業株式会社
相談窓口 ☎ 0745-22-4151
受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**
奈良県大和高田市旭南町2-25

*ジヒドロコデインリン酸塩を含有するもの

**エテンザミドを含有するもの