

2017年7月に改訂しました。(承認基準改正に伴う改訂： _____部)

2017年7月に改訂しました。(事務連絡発出に伴う強調下線の追加： _____部)

2017年7月に改訂しました。(使用上の注意改訂に伴う変更： _____部)

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

かぜ薬 小児用新 **マイフロンシロップ**

「かぜ」にかかると、鼻水が出る、くしゃみが出るなどの症状から、のどが痛い、熱が出る、頭が痛い、さむけがするなどの症状へと進んでいきますので、「かぜ」はひきはじめに治すことが大切です。

小児用新マイフロンシロップは解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬などを配合した飲みやすいシロップ剤で、かぜの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期運用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさがあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（発熱、せき、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の用法・用量を守り、いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。必要な場合には就寝前にも服用してください。また1日6回まで服用しても差し支えありませんが、1日6回服用する場合には、原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。1回量を量り得る容器を添付してあります。

年 齢	1回量	1日服用回数
3歳以上 7歳未満	2.5mL	3～6回
1歳以上 3歳未満	1.8mL	
6ヵ月以上 1歳未満	1.5mL	
3ヵ月以上 6ヵ月未満	1.2mL	
3ヵ月未満の乳児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 7歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

成分・分量

小児用新マイフーロンシロップは、15mL中に下記の成分・分量を含有します。

成分・分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩……………8mg	せき中枢に働いてせきをしずめます。
アセトアミノフェン……………180mg	熱を下げ、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩…2.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……12mg	気管支をひろげてせきをしずめます。
ジリュウ流エキス0.4mL(地竜として400mg)	発熱・悪寒に用いる動物性生薬です。
セネガ流エキス0.2mL(セネガとして200mg)	たんを出しやすくする植物性生薬です。

添加物として、白糖、D-ソルビトール、アルコール、サッカリンNa、クエン酸Na、カラメル、塩化Na、安息香酸Na、クエン酸、l-メントール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目186