

この添付文書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

総合かぜ薬

コフチールこどもかぜシロップ

かぜは年間を通じて、私たちが一番かかりやすい呼吸器系の病気です。かぜくらいと簡単に考えがちですが、こじらせてしまうといういろいろな病気の原因にもなります。特に、こどもはかぜに対する抵抗力が弱いので、早めのお手当が必要になります。柴胡桂枝湯エキスを配合したコフチールこどもかぜシロップは、せき・鼻水・発熱等によく効く飲みやすいシロップ剤です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期運用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

次の1回量を添付の目盛り付きコップで量り、1日3回毎食後及び必要に応じて、就寝前に服用してください。また、1日6回まで服用しても支障ありませんが、その場合には約4時間の間隔を置いて服用してください。

年 齢	1回量
3歳以上7歳未満	10mL
1歳以上3歳未満	7mL
6ヵ月以上1歳未満	6mL
3ヵ月以上6ヵ月未満	5mL
3ヵ月未満	服用しないでください

（用法・用量に関連する注意）

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量と作用】

1日量(60mL)中

成 分	分量	作 用
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支をひろげて緊張をやわらげ、せきをしずめます。
デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	16mg	せき中枢に作用してせきをしずめ、呼吸を楽にします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	80mg	気道粘液の分泌をたかめ、粘りついているたんをうすめて、はき出しやすくします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	25mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
柴胡桂枝湯エキス (原生薬換算量：3000mg)	300mg	熱がでて食欲のない時によく効きます。

添加物として、白糖、D-ソルビトール液、塩化Na、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、ポリリン酸Na、リン酸二水素Na、メタリン酸Na、赤色2号、香料、パニリン、エチルパニリン、グリセリンを含有します。

（成分・分量に関連する注意）

本剤は生薬成分を配合していますので沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振って服用ください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- 服用のつど、ビンの中をよく拭き、フタをしっかりとめておいてください。
- いったん開栓した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- 添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **福地製薬株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824