

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月
2013年3月
(記載要領変更に伴う改訂)
※(使用上の注意の改訂)

㊦

ベルゲン顆粒 第②類医薬品

総合かぜ薬(ゴオウ・リゾチーム塩酸塩配合)

かぜをひきますと、悪寒・鼻水・鼻づまりをはじめとして、さらに、のどの痛み、頭痛、発熱など様々な症状があらわれます。
ベルゲン顆粒は、このような諸症状の改善に、すぐれた効果を発揮するよう11の成分を配合したかぜ薬です。

使用上の注意

⊗ してはいけないこと 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる

1 次の人は服用しないで下さい

- ①本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ②本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがある。)

4 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

5 服用前後は飲酒しないで下さい

6 長期連用しないで下さい



必ずお守り下さい



相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ①医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- ②妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告がある。)
- ④高齢者。
- ⑤薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ⑥本人又は家族がアレルギー体質の人。
- ⑦次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- ⑧次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときぜーぜー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

裏面もお読み下さい→

用法・用量

1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年齢	1回量	服用回数
成人 15歳以上	1包	1日3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
1歳以上3歳未満	1/4包	
1歳未満	服用しない×	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。
- (3) 用法及び用量を厳守して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状

(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



成分・分量と作用

成分	成人1日量(3包)中	作用
アセトアミノフェン	900.0mg	かぜに伴う悪寒、発熱、のどの痛み、筋肉の痛みに効果があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜの初期にみられる、鼻水、鼻づまり、くしゃみに効果があります。
ジヒドロコデインリン酸塩	24.0mg	中枢に作用して、せきをしずめます。
ノスカピン	48.0mg	中枢に作用して、せきをしずめます。
d l-メチルエフェドリン塩酸塩	60.0mg	気管支をひろげてせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240.0mg	気道の粘膜についているたんをうすめて、はきだしやすくします。
無水カフェイン	75.0mg	脳の血管に働いて、頭痛をやわらげます。
リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)	60.0mg(力価)	炎症をしずめて、せきを止めます。
チアミンジスルフィド	24.0mg	ビタミンB1、ビタミンB2をおぎないますと、回復しやすくなります。
リボフラビン	12.0mg	ビタミンB1、ビタミンB2をおぎないますと、回復しやすくなります。
ゴオウ	3.0mg	生薬成分で、強心・解熱作用があります。

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、パレイシヨデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、香料を含有します。

〈成分及び分量に関連する注意〉

※本剤中のビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3 1包を分割した残りを服用する場合には、なるべく湿気の入らないよう袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
- 4 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

明治薬品株式会社お客様相談室

電話 話：☎0120-53-3451

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)