



ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

非ピリン系かぜ薬

エスベンエースAEC

かぜはほとんどの場合、ウイルスによるのど・鼻の炎症が原因です。そのため鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状ではじまり、のどの痛み、せき、たんなどの症状や悪寒、発熱、頭痛といった全身症状がつぎつぎとあらわれ、ときには重なって出てきます。

エスベンエースAECは、鼻水、鼻づまり、熱、せき、痛みなどのかぜのいろいろな症状にお使いいただける総合かぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒をしないでください
5. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(7)次の症状のある人。
(3)授乳中の人。高熱、排尿困難
(4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある
乳・幼・小児(15才未満)。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
(5)高齢者。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の 発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、 全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リン パ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身の だるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々 が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦 しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが 急にあらわれたり、 持続したりする。

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の用量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人 (15才以上)	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
11才未満の乳幼児	服用しないこと ✕	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分とはたらき

9錠(成人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分量(9錠中)	は た ら き
アセトアミノフェン	500mg	「かぜ」による悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みに効果をあらわします。
エテンザミド	600mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状に効果をあらわします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	150mg	たんを切りやすくします。
無水カフェイン	150mg	「かぜ」による頭痛をしずめます。

添加物として、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルデンプン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、酸化チタンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
(5)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと、湿気などのため薬が変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話 0748-52-1232 受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)

発 売 元 白 石 薬 品 株 式 会 社
大阪府茨木市五日市1丁目10番33号
製造販売元 日 野 薬 品 工 業 株 式 会 社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119