

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

かぜ薬

第2類医薬品

フジコール®シロップ 小児用N

葛根湯エキス配合～かぜの諸症状の緩和に～

製品の特徴

フジコールシロップ小児用Nは、かぜの引きはじめにすぐれた効きめをあらわす「葛根湯」のエキスに、その他発熱、せき、鼻水などの諸症状をやわらげる成分を配合したかぜ薬です。甘くて、のみやすいシロップ剤ですから、葉ざらいのお子様でも服用できます。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳祛痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります。)
 4. 服用前後は飲酒しないでください。
 5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、線内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキス・ヨンソン症候群)、中毒性表皮壞死溶解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、*全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

1日3回、1回下記量を毎食後なるべく30分以内に服用し、また必要に応じ就寝前に服用してください。場合により、1日6回まで服用できますが、この場合は原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
3才以上7才未満	5.0mL	3~6回
1才以上3才未満	3.5mL	
6カ月以上1才未満	3.0mL	
3カ月以上6カ月未満	2.5mL	
3カ月未満	服用させないでください	

計量には添付の計量カップをご使用ください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分とはたらき

成 分	分量 (30mL中)	はたらき
アセトアミノフェン	180mg	熱を下げ、頭痛や関節の痛み、のどの痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.4mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりをしめます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	16mg	せきをしめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	72mg	たんをうすめて、切れやすくします。
無水カフェイン	30mg	頭痛をやわらげます。
葛根湯エキス	1,000mg	ゾクゾクと寒気(悪寒)を感じるようなかぜの初期症状によく効きます。

添加物として、パラベン、安息香酸、エタノール、炭酸水素Na、白糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンリコール、ポビドン、カラメル、リン酸、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 一度開封した後は、品質保持の点から冷蔵庫に入れ、なるべく早く服用してください。
- (6) 服用のつど瓶の口をよく拭いてから、フタをしっかりと締めてください。
- (7) 計量カップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (8) 本剤は生薬成分を配合しているため、製品により多少色が異なったり、沈殿を生じる場合がありますが、効果に変わりはありません。よくふってから服用してください。

●ワンポイント情報

かぜは、身体の抵抗力が低下した時に起こりやすい急性炎症の一種です。お子様の「かぜ」は大人のそれに比べて全身に症状があらわれやすく、発熱と共に下痢・嘔吐(おうとう)などの消化器症状を伴いがちです。また、お子様は体力や抵抗力が弱く余病(肺炎、中耳炎など)を引き起こしやすいので、悪化させないように早めの手当が大切です。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎ 03-3293-3363

受付時間 9時~12時、13時~17時 (土、日、祝日を除く)

販売元



湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1